

# Analysis 3, Übungsblatt Nr. 7

Mathematisches Institut  
Prof. Dr. Christoph Thiele  
Dr. Diogo Oliveira e Silva  
Wintersemester 2015/16



**Abgabe in der Vorlesung am 15.12.2015.**

Pro Aufgabe sind 10 Punkte erreichbar.

Für  $d \geq 1$  sei  $\mu$  das Lebesgue-Maß auf  $\mathbb{R}^d$ .

**Aufgabe 1** (Grenzwert und Integral vertauschen). Es ist einfach, die Werte der Limes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{\frac{x}{2}} dx \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$$

zu erraten. Zeigen Sie, dass Ihre Vermutungen richtig sind.

**Aufgabe 2** (Riemann-Lebesgue). Sei  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  eine integrierbare Funktion. Definieren Sie:

$$\widehat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx.$$

Zeigen Sie:

(a)  $\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+h) - f(x)| dx \rightarrow 0$  wenn  $|h| \rightarrow 0$ .

(b)  $|\widehat{f}(\xi)| \rightarrow 0$  wenn  $|\xi| \rightarrow \infty$ .

**Aufgabe 3** (Cantor-Funktion). Seien  $\mathcal{C} \subset [0, 1]$  die Cantor-Menge und  $\mathcal{F} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  die Cantor-Funktion.<sup>1</sup> Wir wissen schon, dass die Funktion  $\mathcal{F}$  monoton steigend ist. Insbesondere erzeugt sie ein äußeres Maß, das  $\nu$  genannt wird. Wie in der Vorlesung sei  $\widetilde{\mathcal{C}} \subset \mathcal{C}$  die Teilmenge aller Elemente, die *keine* endliche ternäre Darstellung besitzen, und sei  $\widetilde{I} \subset [0, 1]$  die Teilmenge aller Elemente, die *keine* endliche binäre Darstellung besitzen. Sei  $\mathcal{N} \subset \widetilde{I} \subset [0, 1]$  eine nicht-messbare Teilmenge des Einheitsintervalles, die nur solche Elemente enthält.

Beweisen Sie:

(a) Die Einschränkung  $\mathcal{F}|_{\widetilde{\mathcal{C}}}$  definiert eine Bijektion zwischen  $\widetilde{\mathcal{C}}$  und  $\widetilde{I}$ .

(b) Die Menge  $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{N})$  erfüllt  $\mu(\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{N})) = 0$  und ist deswegen Lebesgue-messbar.

(c) Die Menge  $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{N})$  ist auf  $\widetilde{\mathcal{C}}$  nicht  $\nu$ -messbar.

**Aufgabe 4** (Fubini). Sei  $\{b_k\}$  eine positive Folge mit  $\sum_{k=0}^\infty b_k = s < \infty$ , und  $a_n := \sum_{k \leq n} b_k$ . Definieren Sie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  in der folgenden Weise:

$$f(x, y) = \begin{cases} a_n & \text{wenn } n \leq x < n+1 \text{ und } n \leq y < n+1, \quad (n \in \mathbb{N}) \\ -a_n & \text{wenn } n \leq x < n+1 \text{ und } n+1 \leq y < n+2, \quad (n \in \mathbb{N}) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für  $x, y \in \mathbb{R}$ , definieren Sie die *Schnitten*:

$$f^y(x) := f(x, y) \text{ und } f_x(y) := f(x, y).$$

Beweisen Sie:

(a) Jede Schnitt  $f^y$  und  $f_x$  hat ein endliches Integral. Für jedes  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\int_{\mathbb{R}} f_x(y) dy = 0$  und deswegen

$$\int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \right) dx = 0.$$

<sup>1</sup>Vgl. Seiten 30-32 des Skripts.

(b) Trotzdem

$$\int_{\mathbb{R}} f^y(x) dx = \begin{cases} a_0 & \text{wenn } 0 \leq y < 1; \\ a_n - a_{n-1} & \text{wenn } n \leq y < n + 1. \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

Deswegen hat  $y \mapsto \int_{\mathbb{R}} f^y(x) dx$  ein endliches Integral auf  $(0, \infty)$  und

$$\int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx \right) dy = s.$$

(c) Die Funktion  $f$  hat ein unendliches Integral:

$$\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} |f(x, y)| dx dy = \infty.$$