

Aufgaben zur Linearen Algebra II

Prof. Dr. C.-F. Bödighheimer

Sommersemester 2015

Blatt 8

Abgabetermin : Freitag, 12.6.2015, 10:00 Uhr (vor der Vorlesung)

For a quartic polynomial

$$\begin{aligned} \Delta(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4) \\ = 256a_0^3a_4^3 - 27a_0^2a_3^4 - 27a_1^4a_4^2 + 16a_0a_2^3a_4 - 4a_0a_2^3a_3^2 - 4a_1^2a_2^3a_4 - 4a_1^3a_3^3 + a_1^2a_2^2a_3^2 \\ - 192a_0^2a_1a_3a_4^2 - 128a_0^2a_2^2a_4^2 + 144a_0^2a_2a_3^2a_4 + 144a_0a_1^2a_2a_4^2 - 6a_0a_1^2a_3^2a_4 \\ - 80a_0a_1a_2^2a_3a_4 + 18a_0a_1a_2a_3^3 + 18a_1^3a_2a_3a_4. \end{aligned} \quad (1.35)$$

For a quintic polynomial

$$\begin{aligned} \Delta(a_0 + a_1x + \dots + a_5x^5) \\ = 3125a_0^4a_5^4 - 2500a_0^3a_1a_4a_5^3 - 3750a_0^3a_2a_3a_5^3 + 2000a_0^3a_2a_4^2a_5^2 + 2250a_0^3a_3^2a_4a_5^2 \\ - 1600a_0^3a_3a_4^3a_5 + 256a_0^3a_4^5 + 2000a_0^2a_1^2a_3a_5^3 - 50a_0^2a_1^2a_4^2a_5^2 + 2250a_0^2a_1a_2^2a_5^3 \\ - 2050a_0^2a_1a_2a_3a_4a_5^2 + 160a_0^2a_1a_2a_4^3a_5 - 900a_0^2a_1a_3^3a_5^2 + 1020a_0^2a_1a_3^2a_4^2a_5 \\ - 192a_0^2a_1a_3a_4^4 - 900a_0^2a_2^3a_4a_5^2 + 825a_0^2a_2^2a_3^2a_5^2 + 560a_0^2a_2^2a_3a_4^2a_5 - 128a_0^2a_2^2a_4^4 \\ - 630a_0^2a_2a_3^3a_4a_5 + 144a_0^2a_2a_3^2a_4^3 + 108a_0^2a_3^5a_5 - 27a_0^2a_4^4a_5^2 - 1600a_0a_1^3a_2a_5^3 \\ + 160a_0a_1^3a_3a_4a_5^2 - 36a_0a_1^3a_4^3a_5 + 1020a_0a_1^2a_2^2a_4a_5^2 + 560a_0a_1^2a_2a_3^2a_5^2 \\ - 746a_0a_1^2a_2a_3a_4^2a_5 + 144a_0a_1^2a_2a_4^4 + 24a_0a_1^2a_3^3a_4a_5 - 6a_0a_1^2a_3^2a_4^4 \\ + 356a_0a_1a_2^2a_3^2a_4a_5 - 80a_0a_1a_2^2a_3a_4^3 - 630a_0a_1a_2^3a_3a_5^2 + 24a_0a_1a_2^3a_3^2a_5 \\ - 72a_0a_1a_2a_3^4a_5 + 18a_0a_1a_2a_3^2a_4^2 + 108a_0a_2^5a_5^2 - 72a_0a_2^4a_3a_4a_5 + 16a_0a_2^4a_4^3 \\ + 16a_0a_2^3a_3^3a_5 - 4a_0a_2^3a_3^2a_4^2 + 256a_1^5a_5^3 - 192a_1^4a_2a_4a_5^2 - 128a_1^4a_3^2a_5^2 \\ + 144a_1^4a_3a_4^2a_5 - 27a_1^4a_4^4 + 144a_1^3a_2^2a_3a_5^2 - 6a_1^3a_2^2a_4^2a_5 - 80a_1^3a_2a_3^2a_4a_5 \\ + 18a_1^3a_2a_3a_4^3 + 16a_1^3a_3^4a_5 - 4a_1^3a_3^3a_4^2 - 27a_1^2a_2^4a_5^2 + 18a_1^2a_2^3a_3a_4a_5 \\ - 4a_1^2a_2^3a_4^3 - 4a_1^2a_2^2a_3^3a_5 + a_1^2a_2^2a_3^2a_4^2. \end{aligned} \quad (1.36)$$

Diskriminante für Polynome vom Grad 4 und 5, aus:

I.M.Gelfand, M.M.Kapranov, A.V.Zelevinsky:

Discriminants, Resultants and Multidimensional Determinants, S. 405 + 406.

Aufgabe 36 (Division mit Rest für Polynome)

Es sei $f(x) = 2x^5 + x^3 + x + 1$ und $g(x) = x^3 - 2x^2 + 1$.

Man dividiere f durch g mit Rest über $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ und \mathbb{F}_2 .

Aufgabe 37 (Begleitmatrix eines Polynoms)

Es sei $p(t) = p_0 + p_1t + p_2t^2 + \dots + p_{n-1}t^{n-1} + t^n$ ein normiertes ($p_n = 1$) Polynom über \mathbb{K} ; die Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 0 & & & & -p_0 \\ 1 & 0 & & & -p_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ & & & 1 & 0 & -p_{n-2} \\ & & & & 1 & -p_{n-1} \end{pmatrix}$$

nennt man die *Begleitmatrix* zu $p(t)$.

(i) Man zeige:

$$\text{CP}_M(t) = (-1)^n p(t). \quad (1)$$

(ii) Gilt $p(t) = \varphi(t)\psi(t)$ und $\text{grad}(\varphi) = n_1, \text{grad}(\psi) = n_2$, so gibt es eine $(n_1 \times n_1)$ -Matrix A und eine $(n_2 \times n_2)$ -Matrix B , so daß für $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ die Aussage (1) mit $n = n_1 + n_2$ gilt.

(iii) Ist $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, so gibt es sogar eine Diagonalmatrix M , so daß (1) gilt.

(iv) Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so gibt es eine Blockmatrix

$$M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_k & & & \\ & & & B_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & B_l \end{pmatrix}$$

mit 1×1 -Matrizen $(\lambda_1), \dots, (\lambda_k)$ und 2×2 -Matrizen B_1, \dots, B_l , so daß (1) gilt, wobei $n = k + 2l$ ist.

Aufgabe 38 (Symmetrische Polynome)

Sei \mathbb{K} ein Körper mit $\text{char } \mathbb{K} = 0$. Die symmetrische Gruppe \mathfrak{S}_n operiert durch Vertauschen der Variablen auf dem Polynomring $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$:

$$\sigma \cdot f(x_1, \dots, x_n) := f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}), \sigma \in \mathfrak{S}_n.$$

Ist $\sigma \cdot f = f$, so heißt f *symmetrisch*; und $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}$ sei die Menge aller symmetrischen Polynome.

(i) $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}$ ist eine \mathbb{K} -Unteralgebra von $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$.

(ii) Die Polynome

$$E_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k} \quad (k = 1, \dots, n), \quad E_0 := 1$$

heißen *elementar-symmetrische Polynome*; und die Polynome

$$P_k(x_1, \dots, x_n) := x_1^k + \dots + x_n^k \quad (k = 1, \dots, n), \quad P_0 := 1$$

heißen *Potenzsummenpolynome*.

Man beweise die *Newton-Gleichungen*:

$$k E_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} P_i(x_1, \dots, x_n) E_{k-i}(x_1, \dots, x_n).$$

- (iii) **Anwendung:** Man drücke für eine Diagonalmatrix D die Koeffizienten $c_k(D)$ des charakteristischen Polynoms $\text{CP}_D(t)$ durch die Spuren $\text{Spur}(D^k)$ der Potenzen aus.

Aufgabe 39 (Alternierende Polynome)

Man nennt ein Polynom $f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ *alternierend*, falls $\sigma \cdot f = f$ gilt für alle $\sigma \in \mathfrak{A}_n$; anders gesagt: $\sigma \cdot f = \text{sign}(\sigma)f$, oder $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$ für $1 \leq i < j \leq n$. Ein Beispiel ist die Vandermonde'sche Determinante

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Für ein alternierendes f ist f^2 natürlich symmetrisch.

Man zeige:

Ist f alternierend, so ist f durch V_n teilbar und der Quotient

$$\frac{f(x_1, \dots, x_n)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)}$$

ist symmetrisch.

(Hinweis: Für $n = 1$ ist nichts zu zeigen. Fassen Sie das Polynom $f(x_1, \dots, x_n)$ als Polynom in x_1 auf, dessen Koeffizienten Polynome in x_2, \dots, x_n sind: $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_k f_k(x_2, \dots, x_n) x_1^k$, gemäß der Isomorphie $K[x_1, x_2, \dots, x_n] = (K[x_2, \dots, x_n])[x_1]$. Zeigen Sie jetzt, dass x_2, \dots, x_n Nullstellen von f als Polynom in x_1 sind.)

*-Aufgabe 40 (Diskriminante)

Es bezeichne

$$D_n(x_1, \dots, x_n) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$$

das Quadrat des Vandermonde'schen Polynoms V_n . Für ein Polynom $f \in \mathbb{K}[x]$ heißt

$$\Delta(f) := \text{Res}(f, f')$$

die *Diskriminante* von f , wobei $f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$ die (formale) Ableitung bezeichnet.

- (i) Für $n = 2$ und $f(x) = ax^2 + bx + c$ sowie $n = 3$ und $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ (ohne quadratischen Term) berechne man die Diskriminante.
(ii) Für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ gilt: f hat genau dann eine mehrfache Nullstelle, wenn $\Delta(f) = 0$.
(iii) Für ein (normiertes) zerfallendes Polynom $f(x) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - x)$ gelten:

$$\Delta(f) = (-1)^{n(n+1)/2} D_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad (2)$$

$$\Delta(f) = \prod_{i=1}^n f'(\lambda_i). \quad (3)$$

