

Mathematik I für Physiker und Physikerinnen

math 140, WS 2011/12

VON PETER KOEPKE UND THORALF RÄSCH

Analysis (P.K.): Mo, Di 8:25-9:55, HS B, Anatomie, Nußallee 10

Lineare Algebra (T.R.): Do 8:25-9:55, HS I, PI

Übungen (Philipp Schlicht): Mi Nachmittag, 3std.

Ziele

Vermittlung der mathematischen Grundbegriffe und Methoden; erforderlich für die Vorlesungen nach dem 1. Semester

Inhalte

Lineare Algebra reelle und komplexe Zahlen, elementare Gruppentheorie, Vektorräume, Skalarprodukt, lineare Gleichungssysteme, Matrizen, Determinante, Eigenwerte, Diagonalisierung symmetrischer Matrizen (Hauptachsentransformation), geometrische Interpretation

Analysis Folgen und Reihen, Differentiation und Integration von Funktionen einer Veränderlichen. Gewöhnliche Differentialgleichungen, lineare Differentialgleichungssysteme und deren allgemeine Lösung, einige spezielle Lösungen. Differentiation von Funktionen mehrerer Veränderlichen.

Literaturhinweis

... O. Forster; Analysis I (Vieweg Wiesbaden)...

Kontakt

Prof. Dr. Peter Koepke, Mathematisches Institut, Endenicher Allee 60, Raum 4.005, Sprechstunde Dienstags 12:15 - 13:15

koepke@math.uni-bonn.de

Sekretariat: U. Müller-Moewes, Mathematisches Institut, Endenicher Allee 60, Raum 4.011, Tel. 0228-73-2947

mmoewes@math.uni-bonn.de

AOR Dr. Thoralf Räsch, Mathematisches Institut, Endenicher Allee 60

raesch@math.uni-bonn.de

Dr. Philipp Schlicht, Mathematisches Institut, Endenicher Allee 60, Raum 4.003

schlicht@math.uni-bonn.de

Homepage

www.math.uni-bonn.de/people/logic/teaching/2011WS/Mathematik_fuer_Physiker.shtml

Übungen

12 Übungsgruppen, 3-stündig, Mittwoch Nachmittag, 13:00-16:00 und 16:00-19:00, Beginn 19.10.2011

Modulprüfung

Klausur, geplant: Donnerstag, 2. Februar. 2012, 8:00-10:00

Nachklausur

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur

erfolgreiche Teilnahme an den Übungen, d.h. erfolgreiche Erledigung der wöchentlichen Hausaufgaben und aktive Teilnahme in der Übungsgruppe

Hausaufgaben

Donnerstag auf der Homepage, erstmals 13.10. Abgabe eine Woche später

Anmeldeformalitäten für die Modulprüfungen

siehe <https://basis.uni-bonn.de>

Einleitung

1. Newtonsches Gesetz: $\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{a} = 0$

2. Newtonsches Gesetz: $\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot (\vec{s})''$

3. Newtonsches Gesetz: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

Hookesches Gesetz (Federgesetz): $\vec{F} = D \cdot \vec{s}$

Elastische Schwingung:

$$D \cdot s(t) = F_{\text{Feder}}(t) = -F_{\text{Trägheit}}(t) = -m \cdot s''(t) = -m \cdot \frac{d^2}{dt^2} s(t)$$

$$s(t) = -\frac{m}{D} \cdot s''(t)$$

Die *Differentialgleichung* $s'' = -\frac{D}{m}s$ wird gelöst durch

$$s(t) = c \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}}t - \varphi_0\right)$$


Beweis.

$$s'(t) = \sqrt{\frac{m}{D}} \cdot c \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{m}{D}}t - \varphi_0\right)$$

$$s''(t) = -\sqrt{\frac{m}{D}} \cdot \sqrt{\frac{m}{D}} \cdot c \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{m}{D}}t - \varphi_0\right) = -\frac{m}{D} \cdot s(t)$$

□

Physik



Feder mit
Federkonstante D

Masse m

Modellieren



Mathematik

$$\vec{F} = D \cdot \vec{s}$$


$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$\vec{F} = m \cdot (\vec{s})''$$

Rechnen
Beweisen



Interpretieren



Amplitude c

Frequenz $\sqrt{\frac{D}{m}}$

Phasenverschiebung φ_0

$$s(t) = c \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t - \varphi_0\right)$$

Mathematik ist grundlegender Teil
der physikalischen
Sprache und Methodik

Analysis

- Differential- und Integralrechnung
- **Infinitesimalrechnung**
- (Calculus)

Unendliche Reihen??

$$\sin(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots$$

Unendlich kleine Elemente??

$$\sin'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

Voraussetzungen

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ ist die Menge der **natürlichen Zahlen**.

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ ist die Menge der **ganzen Zahlen**.

$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, p \in \mathbb{Z}\}$ ist die Menge der **rationalen Zahlen**.

\mathbb{R} ist die Menge der **reellen Zahlen**.

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Auf diesen Mengen sind die algebraischen Operationen

Addition ($x + y$), **Multiplikation** ($x \cdot y$) und **Exponentiation** (x^y) gegeben.

Weiterhin sind die **Relationen** $x < y$ und $x \leq y$ gegeben.

1. Vollständige Induktion

Das Prinzip (Axiom) der vollständigen Induktion.

Sei $A(n)$ eine Aussage in der Variablen n .

Sei $n_0 \in \mathbb{Z}$ eine ganze Zahl.

(Induktionsanfang) Angenommen $A(n_0)$ gilt.

(Induktionsschluss) Angenommen für alle ganzen Zahlen $n \geq n_0$ folgt $A(n + 1)$ aus $A(n)$.

Dann gilt $A(n)$ für alle ganzen Zahlen $\geq n_0$.

Das Prinzip ist anschaulich klar.

Wenn man \mathbb{Z} mengentheoretisch definiert, lässt sich das Prinzip beweisen.

Beispiel

Satz 1. *Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gilt*

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (*)$$

Beweis. $(*)$ ist eine Aussage $A(n)$ in der Variablen n .

Induktionsanfang: Die Aussage gilt für $n_0 = 1$:

$$1^2 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}.$$

Induktionsschluss: Angenommen $n \geq n_0$ und $A(n)$ gelte. Dann ist

$$\begin{aligned}
 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)(n+1)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}
 \end{aligned}$$

Also gilt $A(n+1)$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt (*) für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$. □

Bemerkung

$$\int_0^1 x^2 dx$$

ist der Inhalt der Fläche, die von der x -Achse, der Geraden $x = 1$ und der Parabel x^2 gebildet wird. Anschaulich gilt:

$$\frac{1}{n} \left(\left(\frac{0}{n} \right)^2 + \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right) \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{n} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right)$$

$$\frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2) \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$$

$$\frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{(n-1)(2n-2)}{6} \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{n^2} \cdot \frac{(n+1)(2n+2)}{6} = \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

$$\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

Da $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^3$ und $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$ von unten und oben „beliebig nah“ gegen 1 gehen, gilt:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Definition durch Rekursion (Induktion)

Aus dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt

Das Prinzip der rekursiven Definition.

Sei $n_0 \in \mathbb{Z}$ eine ganze Zahl.

(Rekursionsanfang) Sei das (mathematische) Objekt $F(n_0)$ definiert.

(Rekursionsregel) Es gibt eine Definition, die für alle ganzen Zahlen $n \geq n_0$ $F(n+1)$ aus $F(n)$ definiert.

Dann ist $F(n)$ für alle ganzen Zahlen $\geq n_0$ definiert.

Definition 2. *Definiere die Funktion $n!$ (sprich: n Fakultät) durch Rekursion über n mit Rekursionsanfang*

$$0! = 1$$

und Rekursionsregel

$$(n + 1)! = (n + 1) \cdot (n!).$$

Anschaulich:

$$\begin{aligned} n! &= n \cdot (n - 1)! \\ &= n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2)! \\ &\quad \vdots \\ &= n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 \cdot 0! \\ &= 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n - 1) \cdot n \end{aligned}$$

Definition 3. Für ganze Zahlen a, b definiere die **mehrfache Summe**

$$\sum_{i=a}^b x_i,$$

auch geschrieben $x_a + \dots + x_b$ durch Rekursion über $b \geq a$ mit Rekursionsanfang

$$\sum_{i=a}^a x_i = x_a$$

und Rekursionsregel

$$\sum_{i=a}^{a+1} x_i = \left(\sum_{i=a}^a x_i \right) + x_{a+1}.$$

Für $b < a$ setze weiter $\sum_{i=a}^b x_i = 0$.

Damit ist

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Definition 4. Für ganze Zahlen a, b definiere das **mehrfache Produkt**

$$\prod_{i=a}^b x_i,$$

auch geschrieben $x_a \cdot \dots \cdot x_b$ durch Rekursion über $b \geq a$ mit Rekursionsanfang

$$\prod_{i=a}^a x_i = x_a$$

und Rekursionsregel

$$\prod_{i=a}^{a+1} x_i = \left(\prod_{i=a}^a x_i \right) \cdot x_{a+1}.$$

Für $b < a$ setze weiter $\prod_{i=a}^b x_i = 1$.

Damit ist

$$\prod_{i=1}^n i = n!$$

Rechenregeln für mehrfache Summen und Produkte

Proposition 5. („Assoziativgesetz“) Für alle ganzen Zahlen $a \leq b \leq c$ und reelle Zahlen x_i gilt

$$\sum_{i=a}^c x_i = \sum_{i=a}^b x_i + \sum_{i=b+1}^c x_i$$

und

$$\prod_{i=a}^c x_i = \prod_{i=a}^b x_i \cdot \prod_{i=b+1}^c x_i$$

Anschaulich:

$$x_a + \dots + x_c = (x_a + \dots + x_b) + (x_{b+1} + \dots + x_c)$$

und

$$x_a \cdot \dots \cdot x_c = (x_a \cdot \dots \cdot x_b) \cdot (x_{b+1} \cdot \dots \cdot x_c).$$

Proposition 6. („Kommutativgesetz“) Für alle ganzen Zahlen $a \leq b$ und reelle Zahlen x_i, y_i gilt

$$\sum_{i=a}^b (x_i + y_i) = \sum_{i=a}^b x_i + \sum_{i=a}^b y_i$$

und

$$\prod_{i=a}^b (x_i \cdot y_i) = \prod_{i=a}^b x_i \cdot \prod_{i=a}^b y_i$$

Anschaulich:

$$(x_a + y_a) \dots + (x_b + y_b) = (x_a + \dots + x_b) + (y_a + \dots + y_b)$$

und

$$(x_a \cdot y_a) \cdot \dots \cdot (x_b \cdot y_b) = (x_a \cdot \dots \cdot x_b) \cdot (y_a \cdot \dots \cdot y_b).$$

Proposition 7. („Distributivgesetz“, „Ausmultiplizieren“) Für alle ganzen Zahlen $a \leq b$, $c \leq d$ und reelle Zahlen x_i , y_j und λ gilt

$$\lambda \cdot \sum_{j=c}^d y_j = \sum_{j=c}^d \lambda y_j$$

und

$$\sum_{i=a}^b x_i \cdot \sum_{j=c}^d y_j = \sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d x_i y_j$$

Anschaulich:

$$(x_a + \dots + x_b) \cdot (y_c + \dots + y_d) = (x_a \cdot y_c + \dots + x_b \cdot y_d).$$

Diese Gesetze kann man auch mit dem Prinzip der vollständigen Induktion zeigen.

Etwas Kombinatorik

Definition 8. Für natürliche Zahlen n und k definiere den **Binomialkoeffizienten**

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1} = \prod_{i=1}^k \frac{n-i+1}{i}.$$

Proposition 9. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Beweis.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1} \\ &= \frac{(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)) \cdot ((n-k) \cdot \dots \cdot 1)}{(k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1) \cdot ((n-k) \cdot \dots \cdot 1)} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

□

Satz 10. Sei $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ eine Menge mit paarweise verschiedenen Elementen, $n \geq 1$. Eine k -Folge aus X ist eine Folge (y_1, \dots, y_k) wobei jedes y_i Element von X ist. Eine Folge kann auch Wiederholungen $y_i = y_k$ haben.

a) Es gibt genau n^k (verschiedene) k -Folgen aus X .

b) Es gibt genau

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n + 1 - k) = \prod_{i=1}^k (n + 1 - i)$$

k -Folgen ohne Wiederholungen aus X .

c) Es gibt genau $n!$ **Permutationen** von X , d.h. n -Folgen aus X ohne Wiederholungen.

d) Es gibt genau $\binom{n}{k}$ Teilmengen von X mit genau k Elementen.

Beweis. a) Durch Induktion über $k \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang (-beginn, -verankerung): $k = 0$.

Es gibt genau *eine* 0-Folge aus X , nämlich die leere Folge $()$. Da $n^0 = 1$, gilt die Eigenschaft für $k = 0$.

Induktionsschluss (-schritt): Sei $k \geq 0$ und die Eigenschaft gelte für k . Dann ist

$$F_{k+1} = \{(y_1, \dots, y_k, y_{k+1}) \mid (y_1, \dots, y_k) \text{ ist eine } k\text{-Folge aus } X, y \in X\}$$

die Menge der $k + 1$ -Folgen aus X . Da es nach der Induktionsvoraussetzung n^k k -Folgen aus X gibt, und da X n Elemente hat, hat F_{k+1}

$$n^k \cdot n = n^{k+1}$$

Elemente, womit die Eigenschaft auch für $k + 1$ gilt.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt a) für alle $k \in \mathbb{N}$.

b) *Induktionsanfang* (-beginn, -verankerung): $k = 0$.

Es gibt genau *eine* 0-Folge aus X , nämlich die leere Folge $()$. Diese Folge ist wiederholungsfrei. Da $\prod_{i=1}^0 (n + 1 - k) = 1$, gilt die Eigenschaft für $k = 0$.

Induktionsschluss (-schritt): Sei $k \geq 0$ und die Eigenschaft gelte für k . Dann ist

$$F'_{k+1} = \{(y_1, \dots, y_k, y_{k+1}) \mid y_{k+1} \in X, (y_1, \dots, y_k) \text{ ist wiederholungsfreie } k\text{-Folge aus } X \setminus \{y_{k-1}\}\}$$

die Menge der wiederholungsfreien $k + 1$ -Folgen aus X . Es gibt genau n verschiedene Möglichkeiten für die Wahl von y_{k+1} und nach Induktionsvoraussetzung $(n - 1) \cdot \dots \cdot ((n - 1) + 1 - k) = (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k) = \prod_{i=1}^k (n - i)$ wiederholungsfreie k -Folgen aus $X \setminus \{y_{k-1}\}$. Damit hat F'_{k+1} genau

$$n \cdot [(n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k)] = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k) = \prod_{i=1}^{k+1} (n + 1 - i)$$

Elemente, d.h., die Eigenschaft gilt für $k + 1$. Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt die Eigenschaft für alle $k \in \mathbb{N}$.

c) ist ein Spezialfall von b) mit $k = n$. Es gibt genau

$$\prod_{i=1}^n (n + 1 - i) = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

Permutationen von X .

d) Es gibt genau $\binom{n}{k}$ Teilmengen von X mit genau k Elementen. Sei P die Menge der Teilmengen von X , die genau k Elemente haben, sei $\text{card}(P)$ die Anzahl der Elemente von P (die „Kardinalität“). Sei F' die Menge der wiederholungsfreien k -Folgen aus X . Dann ist

$$F' = \{((y_1, \dots, y_k) | Y \in P, (y_1, \dots, y_k) \text{ ist wiederholungsfreie } k\text{-Folge aus } Y)\}.$$

Nach c) ist $\text{card}(F') = \text{card}(P) \cdot k!$. Nach b) ist

$$\text{card}(P) = \frac{\text{card}(F')}{k!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n+1-k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

□

Größenordnungen

$0! = 1, 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120, 6! = 720, 7! = 5040, \dots$

$10! \approx 3 \cdot 10^6, 20! \approx 2 \cdot 10^{18}, 100! \approx 10^{158}, \dots$

Die Funktion $n!$ wächst schneller als die Funktion n^k , für jedes feste $k \geq 1$:
wenn $n > 2k$, dann

$$\begin{aligned} n! &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot \dots \cdot (k+1) \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1 \\ &\geq (k+1) \cdot (n \cdot 1) \cdot ((n-1) \cdot 2) \cdot ((n-2) \cdot 3) \cdot \dots \cdot ((n-k+1) \cdot k) \\ &\geq (k+1) \cdot \underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_k \\ &> n^k \end{aligned}$$

Die Funktion $n!$ wächst schneller als die Funktion k^n , für jedes feste $k \geq 2$:
wenn $n > 2k^2$, dann ist $n - \frac{n}{2} > k^2$, $n - k^2 > \frac{n}{2}$ und

$$\begin{aligned}
n! &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (k^2+1) \cdot k^2 \cdot \dots \cdot 1 \\
&> \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (k^2+1)}_{n-k^2} \\
&\geq \underbrace{k^2 \cdot \dots \cdot k^2}_{> \frac{n}{2}} \\
&> k^n
\end{aligned}$$

Andererseits ist für alle $n \geq 2$:

$$n! = 1 \cdot \dots \cdot n < \underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_n = n^n$$

Nach Satz 10 d) gibt es

$$\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 13983816$$

6-elementige Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3, \dots, 49\}$.

Um 6 Richtige bei 6 aus 49 mit einer mittleren Gewinnausschüttung von 500000 Euro zu tippen, müssen durchschnittlich ca. 14 Millionen Tipps zum Preis von 14 Millionen Euro abgegeben werden.

Satz 11. Für $1 \leq k \leq n$ gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$


Beweis.

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{(k-1) \cdot \dots \cdot 1} + \frac{(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k)}{k \cdot \dots \cdot 1} \\ &= \frac{(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot [k+n-k]}{k \cdot \dots \cdot 1} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot \dots \cdot 1} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

□

Das Pascalsche Dreieck

Die Binomialkoeffizienten bilden das **Pascalsche Dreieck**.



Ein Eintrag im Pascalschen Dreieck zählt die Anzahl der Wege von der Spitze des Dreiecks bis zu dem Eintrag, wenn man an jeder Stelle des Weges halblinks oder halbrechts nach unten geht. Die Zahl 210 in der untersten Reihe des Bildes bedeutet, dass es genau 210 verschiedene Wege gibt, bei denen 6 Mal halblinks und 4 Mal halbrechts gegangen wird.

Stochastische Interpretationen des Pascalschen Dreiecks: wenn die Entscheidung zwischen halblinks oder halbrechts zufällig mit den Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{2}$ ist, so ist jeder Weg der Länge 10 gleich wahrscheinlich.

Bei 10 Würfeln einer fairen Münze mit Kopf und Zahl ist das Ergebnis oder die Zufallsvariable „Anzahl Kopf“ folgendermaßen verteilt:

Anzahl „Kopf“	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$\frac{1}{1024}$	$\frac{10}{1024}$	$\frac{45}{1024}$	$\frac{120}{1024}$	$\frac{210}{1024}$	$\frac{252}{1024}$	$\frac{210}{1024}$	$\frac{120}{1024}$	$\frac{45}{1024}$	$\frac{10}{1024}$	$\frac{1}{1024}$

Die Zufallsvariable „Kopf“ ist **binomial verteilt**.

Die binomische Formel

Satz 12. Für alle natürlichen Zahlen n und alle reellen Zahlen x, y :

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i \quad (*)$$

Beweis. Durch vollständige Induktion über n .

Induktionsanfang:

$$(x + y)^0 = 1 = \binom{1}{1} x^0 y^0 = \sum_{i=0}^0 \binom{0}{i} x^{0-i} y^i.$$

Induktionsschluss: Die binomische Formel (*) gelte für n . Dann ist

$$\begin{aligned} (x + y)^{n+1} &= (x + y) \cdot (x + y)^n \\ &= (x + y) \cdot \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x \cdot \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i + y \cdot \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i \\
&= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i+1} y^i + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^{i+1} \\
&= x^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} x^{n-i+1} y^i + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} x^{n-i} y^{i+1} + y^{n+1} \\
&= x^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} x^{n-i+1} y^i + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i-1} x^{n-i+1} y^i + y^{n+1} \\
&= x^{n+1} + \sum_{i=1}^n \left(\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} \right) x^{n-i+1} y^i + y^{n+1} \\
&= \binom{n+1}{0} x^{n+1} y^0 + \sum_{i=1}^n \binom{n+1}{i} x^{(n+1)-i} y^i + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1} \\
&= \sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} x^{(n+1)-i} y^i
\end{aligned}$$

Damit gilt die binomische Formel für $n + 1$. Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt der Satz. □

Folgerung 13. Für alle natürlichen Zahlen n und alle reellen Zahlen x, y :

$$(x - y)^n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} x^{n-i} y^i \quad (*)$$

Spezialfälle

- $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
- $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 1^{n-i} 1^i = (1 + 1)^n = 2^n$
- $\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \dots \pm \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 1^{n-i} (-1)^i = (1 - 1)^n = 0$

Die geometrische Reihe

Satz 14. Für alle natürlichen Zahlen k und alle reellen Zahlen $q \neq 1$ ist die (endliche) geometrische Reihe

$$\sum_{i=0}^k q^i = 1 + q^1 + \dots + q^k = \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1}.$$

Beweis. *Induktionsanfang:* Für $k = 0$:

$$\sum_{i=0}^0 q^i = q^0 = 1 = \frac{q^1 - 1}{q - 1} = \frac{q^{0+1} - 1}{q - 1}$$

Induktionsschluss: Die Behauptung gelte für k . Dann ist

$$\sum_{i=0}^{k+1} q^i = \left(\sum_{i=0}^k q^i \right) + q^{k+1} = \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1} + q^{k+1} = \frac{q^{k+1} - 1 + q^{k+2} - q^{k+1}}{q - 1} = \frac{q^{k+2} - 1}{q - 1}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt der Satz. □

Körper

Die reellen Zahlen \mathbb{R} erfüllen die folgenden **Körperaxiome**:

K1: $x + (y + z) = (x + y) + z$ (*Assoziativgesetz* der Addition)

K2: $x + 0 = x$ (0 ist das *neutrale Element* der Addition)

K3: $x + (-x) = 0$ ($-x$ ist das *inverse Element* zu x bzgl. der Addition)

K4: $x + y = y + x$ (*Kommutativgesetz* der Addition)

K5: $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (*Assoziativgesetz* der Multiplikation)

K6: $x \cdot 1 = x$ (1 ist das *neutrale Element* der Multiplikation)

K7: $x \neq 0 \rightarrow x \cdot x^{-1} = 1$ (x^{-1} ist das *inverse Element* zu x bzgl. der Multiplikation)

K8: $x \cdot y = y \cdot x$ (*Kommutativgesetz* der Multiplikation)

K9: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (*Distributivgesetz*)

K10: $0 \neq 1$

Definition 15. Eine Struktur $(S, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ ist ein **Körper**, wenn sie die Körperaxiome K1-K10 erfüllt. Dabei kann die Trägermenge S verschieden von \mathbb{R} sein, sowie $+, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1$ verschieden von den reellen Operationen.

Ein Körper erfüllt einfache Rechenregeln und ist gegenüber Subtraktion und Division abgeschlossen.

Satz 16. $(\mathbb{R}, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ und $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ sind Körper. $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0, 1)$ und $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ sind keine Körper.

Beweis. Auf der Menge $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gibt es keine $^{-1}$ -Funktion. Auf der Menge \mathbb{N} gibt es keine $-$ -Funktion. \square

Wir werden bald den Körper $(\mathbb{C}, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ der komplexen Zahlen einführen, der in gewisser Weise bessere Abschlusseigenschaften als \mathbb{R} besitzt.

Satz 17. *Die folgenden Behauptungen folgen aus den Körperaxiomen*

a) $-0 = 0$

b) $-(-x) = x$

c) $-(x + y) = (-x) + (-y)$

d) $x \cdot 0 = 0$

e) $x \neq 0 \rightarrow x^{-1} \neq 0$

f) $x \cdot y = 0 \rightarrow x = 0$ oder $y = 0$

g) $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$

h) $(-1) \cdot x = -x$

i) $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$ („minus mal minus ist plus“)

j) Für alle $x, y \neq 0$ ist $(x^{-1})^{-1} = x$ und $(x \cdot y)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$

Beweis. a) $-0 \stackrel{K2}{=} (-0) + 0 \stackrel{K4}{=} 0 + (-0) \stackrel{K3}{=} 0.$

b) $-(-x) = -(-x) + 0 = -(-x) + x + (-x) = -(-x) + (-x) + x = (-x) + (-(-x)) + x = 0 + x = x + 0 = x.$

c) $-(x+y) = -(x+y) + x + (-x) + y + (-y) = -(x+y) + (x+y) + (-x) + (-y) = (-x) + (-y).$

d) $x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0 + (-x \cdot 0) = x \cdot (0 + 0) + (-x \cdot 0) = x \cdot 0 + (-x \cdot 0) = 0.$

e) Sei $x \neq 0$. Angenommen $x^{-1} = 0$. [Wir wollen diese Annahme zum Widerspruch führen und damit $x^{-1} \neq 0$ beweisen.] Dann gilt:

$$1 = x \cdot x^{-1} = x \cdot 0 = 0$$

Das aber widerspricht dem Axiom K10: $0 \neq 1$. □

Definition 18. Sei $(S, +, \cdot, -, {}^{-1}, 0, 1)$ ein Körper. Für $x, y \in S$ definiere

- die **Differenz** $x - y = x + (-y)$
- falls $y \neq 0$ den **Quotienten** $\frac{x}{y} = x \cdot (y^{-1})$
- für $n \in \mathbb{N}$ die **Potenz** x^n rekursiv

$$x^0 = 1 \text{ und } x^{n+1} = (x^n) \cdot x$$

- falls $x \neq 0$ für $m \in \mathbb{Z}$ mit $m < 0$ die **Potenz**

$$x^m = \left(\frac{1}{x}\right)^{-m}.$$

Satz 19. Die Exponentiation erfüllt folgende Gesetze:

a) für $n \in \mathbb{N}$ ist $x^n = \prod_{i=1}^n x = \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_n$

b) $(x^m) \cdot (x^n) = x^{m+n}$

c) $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

d) $(x^m) \cdot (y^m) = (x \cdot y)^m$

e) die binomische Formel $(x - y)^n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$

Beweis. Durch vollständige Induktion. Man beachte, dass im Beweis der binomischen Formel nur die Körperaxiome benutzt wurden. \square

Für arithmetische Ausdrücke / Terme benutzen wir die üblichen Schreibweisen: Weglassen von Multiplikationspunkten und redundanten Klammern, Operatorpräzedenz („Punktrechnung geht vor Strichrechnung“): z.B.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

In der (Linearen) **Algebra** werden Strukturen betrachtet, die nur einen Teil der Axiome erfüllen.

Eine Struktur $(G, +', -', 0')$, die die Axiome K1-K3 erfüllt, ist eine **Gruppe**.

Beispiel. Die Menge der Permutationen der Menge $\{1, 2, \dots, n\}$ bildet die **symmetrische Gruppe** $\mathcal{S}_n = (\mathcal{S}_n, \circ, ^{-1}, \text{id})$. Die Verknüpfung zweier Permutation ist definiert als

$$(a_1, \dots, a_n) \circ (b_1, \dots, b_n) = (a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_n})$$

Z.B. ist $(4, 3, 2, 1) \circ (2, 1, 4, 3) = (3, 4, 1, 2)$. Das Inverse einer Permutation ist definiert als

$$(a_1, \dots, a_n)^{-1} = (b_1, \dots, b_n),$$

wobei $a_{b_1} = 1, a_{b_2} = 2, \dots, a_{b_n} = n$. Die „neutrale“ Permutation ist die Identität

$$\text{id} = (1, \dots, n)$$

Eine Struktur $(G, +', -', 0')$, die die Axiome K1-K4 erfüllt, ist eine **kommutative Gruppe**.

Beispiele. Die Strukturen $(\mathbb{R}, +, -, 0)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot, ^{-1}, 1)$, $(\mathbb{Z}, +, -, 0)$ sind kommutative Gruppen.

Die Struktur $\mathcal{S}_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ ist eine kommutative Gruppe.

Die Vektoren in einem Vektorraum bilden eine kommutative Gruppe

Die Struktur $\mathcal{S}_3 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$ ist *keine* kommutative Gruppe, denn

$$(1, 3, 2) \circ (2, 1, 3) = (3, 1, 2)$$

$$(2, 1, 3) \circ (1, 3, 2) = (2, 3, 1)$$

Ordnungen

Die Ordnung $<$ auf der Menge \mathbb{R} der reellen Zahlen erfüllt die folgenden Axiome einer **linearen Ordnung**:

O1: $x \not< x$ (*Irreflexivität*)

O2: $x < y$ und $y < z \rightarrow x < z$ (*Transitivität*)

O3: $x < y$ oder $x = y$ oder $y < x$ (*Linearität*)

Definition 20. *Eine Struktur $(S, <)$ ist eine (strikte) lineare Ordnung, wenn sie die Axiome O1-O3 erfüllt. Dabei kann die Trägermenge S verschieden von \mathbb{R} sein, sowie $<$ verschieden von dem üblichen $<$.*

$(\mathbb{N}, <)$, $(\mathbb{Z}, <)$, $(\mathbb{Q}, <)$ und $(\mathbb{R}, <)$ sind lineare Ordnungen. Wenn nur die Axiome O1-O2 gelten, spricht man von einer **(strikten) partiellen Ordnung**.

Wir schreiben $x \leq y$ für $(x < y$ oder $x = y)$, und $y > x$ bzw. $y \geq x$ für $x < y$ und $x \leq y$.

Satz 21. Sei $(S, <)$ eine lineare Ordnung. Dann gilt für alle $x, y \in S$ genau eine der Relationen $x < y$, $x = y$ und $y < x$.

Beweis. Nach O3 (Linearität) gilt *mindestens* eine der Relationen.

Angenommen $x < y$ und $x = y$. Dann ist $x < x$, im Widerspruch zu O1 (Irreflexivität).

Angenommen $x = y$ und $y < x$. Dann ist $x < x$, im Widerspruch zu O1 (Irreflexivität).

Angenommen $x < y$ und $y < x$. Nach O2 (Transitivität) ist $x < x$, im Widerspruch zu O1 (Irreflexivität). \square

In diesem Beweis wird das Prinzip des **Widerspruchsbeweises** benutzt. Um zu zeigen, dass *nicht* ($x < y$ und $x = y$) wird das *Gegenteil angenommen*, nämlich $x < y$ und $x = y$, und zum *Widerspruch* geführt.

Geordnete Körper

Die reellen Zahlen erfüllen die Axiome für **geordnete Körper**, in denen arithmetische Struktur und Ordnungsstruktur wechselwirken:

$$\text{AK1: } x < y \rightarrow x + z < y + z$$

$$\text{AK2: } 0 < x \text{ und } 0 < y \rightarrow 0 < x y$$

Definition 22. *Eine Struktur $(S, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1, <)$ ist ein geordneter Körper wenn:*

a) $(S, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ ist ein Körper

b) $(S, <)$ ist eine lineare Ordnung

c) $(S, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1, <)$ erfüllt die Axiome AK1 und AK2.

Satz 23. *In einem geordneten Körper gelten:*

a) $x > 0 \leftrightarrow -x < 0$

b) $x < y \leftrightarrow x - y < 0$

c) $x < y$ und $z > 0 \rightarrow xz < yz$

d) $x < y$ und $z < 0 \rightarrow xz > yz$

e) $x \neq 0 \rightarrow x^2 > 0$

f) $1 > 0$

g) $x > 0 \rightarrow x^{-1} > 0$

h) $x > y > 0 \rightarrow x^{-1} < y^{-1}$

i) $y < x < 0 \rightarrow x^{-1} < y^{-1}$

Diese Gesetze sind für den geordneten Körper der reellen Zahlen klar und bekannt. Sie lassen sich abstrakt aus den Axiomen K1-K10, O1-O3 und A1-A2 beweisen.

Beweis. a) Sei $x > 0$.

Angenommen $-x > 0$. Nach AK1 ist dann

$$0 = x + (-x) > x + 0 > 0 + 0 = 0$$

und $0 > 0$. Widerspruch.

Angenommen $-x = 0$. Nach AK1 ist dann

$$0 = x + (-x) > 0 + 0 = 0.$$

Widerspruch.

Also ist $-x < 0$.

Umgekehrt sei $-x < 0$.

Angenommen $x < 0$. Nach AK1 ist dann

$$0 = x + (-x) < 0 + (-x) < 0 + 0 = 0.$$

Widerspruch.

Angenommen $x = 0$. Nach AK1 ist dann

$$0 = x + (-x) = 0 + (-x) < 0 + 0 = 0.$$

Widerspruch.

Also ist $x > 0$.

b) Sei $x < y$. Dann ist $x - y = x + (-y) < y + (-y) = 0$.

Umgekehrt sei $x - y < 0$. Dann ist $x = (x - y) + y < 0 + y = y$.

c) Sei $x < y$ und $z > 0$. Dann ist $y - x > 0$, $yz - xz = (y - x)z > 0$, und $xz < yz$.

d) Sei $x < y$ und $z < 0$. Dann ist $-z > 0$ und $xz - yz = (y - x)(-z) > 0$. Also ist $xz > yz$.

e) Sei $x \neq 0$.

Fall 1. $x > 0$. Dann ist $x^2 = x x > 0$.

Fall 2. $x < 0$. Dann ist $-x > 0$ und $x^2 = (-x)(-x) > 0$.

f) Mit *e)* ist $1 = 1 \cdot 1 > 0$.

g) Sei $x > 0$. Angenommen $x^{-1} < 0$. Dann ist $-x^{-1} > 0$, $-1 = x(-x^{-1}) > 0$ und $1 < 0$. Widerspruch zu *f)*.

h) Sei $x > y > 0$. Angenommen $x^{-1} > y^{-1}$. Dann ist

$$1 = x x^{-1} > y x^{-1} > y y^{-1} = 1,$$

Widerspruch. Also ist $x^{-1} < y^{-1}$.

□

Der Absolutbetrag

Definition 24. Für ein Element x eines geordneten Körpers definiere den (Absolut-)Betrag $|x|$ von x durch

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0 \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$


Satz 25.

- a) $|x| \geq 0$
- b) $|x| = 0 \leftrightarrow x = 0$
- c) $-|x| \leq x \leq |x|$
- d) $|-x| = |x|$
- e) $|xy| = |x||y|$
- f) $|x^n| = |x|^n$
- g) $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$

Satz 26. (Dreiecksungleichung) *Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt*

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Die Bezeichnung „Dreiecksungleichung“ lässt sich aus der linearen Algebra motivieren, wo man $|\vec{x}|$ als „Länge“ des Vektors \vec{x} interpretieren kann. Die Länge einer Dreiecksseite ist beschränkt durch die Summe der Längen der beiden anderen Dreiecksseiten:



$$|\vec{x} + \vec{y}| \leq |\vec{x}| + |\vec{y}|$$

Beweis. Es gilt $-|x| \leq x \leq |x|$ und $-|y| \leq y \leq |y|$. Daraus folgt

$$-(|x| + |y|) = -|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$$

und

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□

Anwendung der Dreiecksungleichung auf $u = x + y$ und $v = -y$ ergibt

$$|x| = |u + v| \leq |u| + |v| = |x + y| + |-y| = |x + y| + |y|$$

und

$$|x + y| \geq |x| - |y|$$

Satz 27. (Bernoullische Ungleichung) *Sei $x \geq -1$ eine reelle Zahl und $n \in \mathbb{N}$. Dann ist*

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Beweis. Durch Induktion über $n \in \mathbb{N}$. Induktionsbeginn:

$$(1 + x)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot x.$$

Für den Induktionsschluss sei $n \in \mathbb{N}$ und $(1 + x)^n \geq 1 + nx$. Dann ist

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x) \geq (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + x^2 \geq 1 + (n + 1)x$$

Die erste Ungleichheit benutzt, dass $1 + x \geq 0$. □

R ist ein archimedischer Körper

Im Rahmen der Infinitesimalrechnung werden Limes oder Grenzwerte durch Betragsabschätzungen definiert. Wir hatten einleitend das Integral $\int_0^1 x^2 dx$ betrachtet mit der Abschätzung:

$$\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

Wir benötigen, dass die Ausdrücke $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$ und $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$ für hinreichend große *natürliche* Zahlen beliebig nahe bei 1 liegen, so dass für „kleines“ ε

$$\left| \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 - 1 \right| < \varepsilon$$

Die reellen Zahlen zusammen mit den natürlichen Zahlen erfüllen das **Archimedische Axiom**:

Für alle positiven reellen Zahlen $x, y > 0$ gibt es eine natürliche Zahl n mit

$$n x > y.$$

Man nennt die reellen Zahlen auch einen **Archimedischen Körper**.

Mit einer *endlichen* Anzahl von Schritten der Länge x kann man beliebig hoch in den reellen Zahlen kommen. Das ist entscheidend für die Approximation von Integralen, die man sich als „unendliche Summen“ vorstellen kann, durch *endliche* Summen.

Wir zeigen einige Konsequenzen des Archimedischen Axioms.

Satz 28. *Zu jeder reellen Zahl $\varepsilon > 0$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$.*

Beweis. Für $x = 1$ und $y = \frac{1}{\varepsilon}$ liefert das Archimedische Axiom ein $n \in \mathbb{N}$, so dass $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Dann ist $\frac{1}{n} < \varepsilon$. □

Satz 29. Sei $b > 1$ und $K \in \mathbb{R}$. Dann gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $b^n > K$.

Beweis. Sei $b = 1 + x$ mit $x > 0$. Nach dem Archimedischen Axiom wähle ein $n \in \mathbb{N}$ mit $nx > K$. Nach der Bernoullischen Ungleichung ist

$$b^n = (1 + x)^n \geq 1 + nx > nx > K.$$

□

Satz 30. Sei $b \in \mathbb{R}$, $|b| < 1$ und sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $|b^n| < \varepsilon$.

Beweis. *Fall 1.* $b > 0$. Dann ist $b^{-1} > 1^{-1} = 1$. Nach dem vorangehenden Satz gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $(b^n)^{-1} = (b^{-1})^n > \varepsilon^{-1}$. Dann ist $|b^n| = b^n < \varepsilon$.

Fall 2. $b = 0$. Dann ist $|b^1| = |0| < \varepsilon$.

Fall 3. $b < 0$. Wende Fall 1 auf $-b > 1$ an. Wähle $n \in \mathbb{N}$ mit $|(-b)^n| < \varepsilon$. Dann ist $|b^n| = |(-b)^n| < \varepsilon$. □

Satz 31. *Zu jeder reellen Zahl x gibt es eine eindeutig bestimmte ganze Zahl n mit*

$$n \leq x < n + 1 \quad (*)$$

Beweis. Wir zeigen den Satz nur für $x \geq 0$.

(Existenz) Angenommen es gibt keine ganze Zahl mit $(*)$. Dann haben wir: wenn $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x$, dann ist $n + 1 \leq x$. Dies ist der Induktionsschritt für die Eigenschaft $n \leq x$. Außerdem gilt der Induktionsanfang $0 \leq x$. Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ dass $n \leq x$. Andererseits gibt es nach dem Archimedischen Axiom ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so dass $n_0 = n_0 \cdot 1 > x$. Das ist ein Widerspruch. Folglich gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n \leq x < n + 1$.

(Eindeutigkeit) Angenommen, es gäbe verschiedene natürliche Zahlen $m < n$ mit

$$m \leq x < m + 1 \text{ und } n \leq x < n + 1.$$

Dann ist $x < m + 1 \leq n \leq x$ und $x < x$. Widerspruch zu O1. □


Abschlusseigenschaften von Zahlbereichen

Die Struktur \mathbb{N} der **natürlichen Zahlen** ist der ursprüngliche Zahlbereich.

Die Struktur \mathbb{Z} der **ganzen Zahlen** vervollständigt \mathbb{N} bezüglich der Bildung von Differenzen $x - y$.

Die Struktur \mathbb{Q} der **rationalen Zahlen** vervollständigt \mathbb{Z} bezüglich der Bildung von Quotienten $\frac{x}{y}$ mit $y \neq 0$.

Die Struktur \mathbb{R} der **reellen Zahlen** vervollständigt \mathbb{Q} bezüglich der Existenz von *Nullstellen* gewisser, „stetiger“ Funktionen: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $x_0 \leq x_1$ reelle Zahlen mit $f(x_0) \leq 0$ und $f(x_1) \geq 0$. Dann gibt es eine reelle Zahl z mit $x_0 \leq z \leq x_1$ und $f(z) = 0$ (**Zwischenwertsatz**).



Satz 32. Zu jeder nicht-negativen reellen Zahl $a \geq 0$ existiert eine Quadratwurzel $\sqrt{a} \geq 0$ mit

$$(\sqrt{a}) \cdot (\sqrt{a}) = a$$

Beweis. Sei $f(x) = x^2 - a$. Dann ist $f(0) = -a \leq 0$ und $f(a+1) = a^2 + a + 1 \geq a \geq 0$. Nach dem Zwischenwertsatz existiert eine reelle Zahl $z \geq 0$ mit $f(z) = 0$, d.h.

$$z \cdot z = a.$$

In der Struktur \mathbb{R} besitzen negative Zahlen $b < 0$ keine Quadratwurzeln.

Komplexe Zahlen


Ursprüngliche Motivation für die Einführung der komplexen Zahlen ist die Forderung nach der Existenz von Quadratwurzeln für *alle* Zahlen. Insbesondere soll es eine Zahl $i = \sqrt{-1}$ mit $i \cdot i = -1$ geben.

i wird die *imaginäre Einheit* genannt.


i kann kein Element von \mathbb{R} sein, aber man soll mit i weitgehend wie mit reellen Zahlen rechnen können, z.B.

$$\begin{aligned}(x + i y) \cdot (x' + i y') &= x x' + i x y' + i y x' + i i y y' \\ &= x x' + i (x y' + y x') + (-1) y y' \\ &= (x x' - y y') + i (x y' + y x')\end{aligned}$$

Die Menge der reellen Zahlen wird oft als *Zahlengerade* dargestellt:



Die komplexen Zahlen bilden eine *Zahlenebene*, die **komplexe Ebene**:



Definition 33. Die Menge der **komplexen Zahlen** ist die Menge aller geordneten Paare reeller Zahlen:

$$\mathbb{C} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Für $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ ist $x = : \Re(z)$ der **Realteil** von z und $y = : \Im(z)$ der **Imaginärteil** von z . Definiere Operationen $+$, \cdot , $-$, $^{-1}$ für $(x, y), (x', y') \in \mathbb{C}$ durch

$$(x, y) + (x', y') := (x + x', y + y')$$

$$(x, y) \cdot (x', y') := (x x' - y y', x y' + y x')$$

$$-(x, y) := (-x, -y)$$

$$(x, y)^{-1} := \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \text{ (falls } (x, y) \neq (0, 0) \text{)}$$

Weiter definiere die Konstanten $0 := (0, 0)$, $1 := (1, 0)$, und die **imaginäre Einheit** $i := (0, 1)$.

Satz 34. $(\mathbb{C}, +, \cdot, -, ^{-1}, 0, 1)$ ist ein Körper.

Beweis. Hier sind die Körperaxiome K1-K10 zu überprüfen. Wir beschränken uns auf ein paar Fälle. Die additiven Axiome K1-K4 gelten, weil die sie „komponentenweise in den reellen Koordinaten x und y gelten. Die multiplikativen Axiome sind weniger anschaulich.

Für die Assoziativität K5 multiplizieren wir aus:

$$\begin{aligned} ((x, y) \cdot (x', y')) \cdot (x'', y'') &= (x x' - y y', x y' + y x') \cdot (x'', y'') = \\ &= (x x' x'' - y y' x'' - x y' y'' - y x' y'', x x' y'' - y y' y'' + x y' x'' + y x' x'') \text{ und} \\ (x, y) \cdot ((x', y') \cdot (x'', y'')) &= (x, y) \cdot (x' x'' - y' y'', x' y'' + y' x'') = \\ &= (x x' x'' - x y' y'' - y x' y'' - y y' x'', x x' y'' + x y' x'' + y x' x'' - y y' y''). \end{aligned}$$

$$\text{K6: } (x, y) \cdot (1, 0) = (x \cdot 1, y \cdot 1) = (x, y).$$

K7: Sei $(x, y) \neq 0$. Dann ist $x^2 + y^2 > 0$. Weiter ist

$$(x, y) \cdot (x, y)^{-1} = (x, y) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \left(\frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}, \frac{-x y + y x}{x^2 + y^2} \right) = (1, 0) = 1.$$

Die Kommutativität K8 folgt aus Symmetriegründen.

$$\begin{aligned} \text{K9: } (x, y) \cdot ((x', y') + (x'', y'')) &= (x, y) \cdot (x' + x'', y' + y'') = \\ &= (x x' + x x'' - y y' - y y'', x y' + x y'' + y x' + y x'') \text{ und} \\ (x, y) \cdot (x', y') + (x, y) \cdot (x'', y'') &= (x x' - y y', x y' + y x') + (x x'' - y y'', x y'' + \\ &+ y x'') = (x x' - y y' + x x'' - y y'', x y' + y x' + x y'' + y x''). \end{aligned}$$

Schließlich ist $0 = (0, 0) \neq (1, 0) = 1$. □

Wir „identifizieren“ die reelle Zahl x mit der komplexen Zahl $(x, 0)$. Dann gilt


Satz 35. $i \cdot i = -1$ und $(x, y) = x + i y$.

Beweis. $i i = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$.

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + i y. \quad \square$$

Man schreibt üblicherweise $x + i y$ für $(x, y) \in \mathbb{C}$.

Geometrische Interpretation von $+$



$$(x, y) + (x', y') = \\ = (x + x', y + y')$$


Die Summe $(x, y) + (x', y')$ entspricht der **vektoriellen Addition** der „Vektoren“ (x, y) und (x', y') .

Der Absolutbetrag auf \mathbb{C}

Definition 36. Für $z = x + i y \in \mathbb{C}$ definiere den (Absolut-)Betrag

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Nach dem Satz des Pythagoras ist $|z|$ der Abstand der Punkte $(0, 0)$ und (x, y) in der x - y -Ebene.



Geometrische Interpretation von \cdot


Aus der Abbildung folgt, dass wir z darstellen können als

$$z = (|z| \cdot \cos \alpha, |z| \cdot \sin \alpha).$$

Dann ist mit $z' = (|z'| \cdot \cos \alpha', |z'| \cdot \sin \alpha')$

$$\begin{aligned} z \cdot z' &= (|z| \cdot \cos \alpha, |z| \cdot \sin \alpha) \cdot (|z'| \cdot \cos \alpha', |z'| \cdot \sin \alpha') \\ &= (|z| \cdot |z'| \cdot \cos \alpha \cdot \cos \alpha' - |z| \cdot |z'| \cdot \sin \alpha \cdot \sin \alpha', |z| \cdot |z'| \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha' + \\ &\quad |z| \cdot |z'| \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha') \\ &= |z| \cdot |z'| \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \alpha' - \sin \alpha \cdot \sin \alpha', \cos \alpha \cdot \sin \alpha' + \sin \alpha \cdot \cos \alpha') \\ &= |z| \cdot |z'| \cdot (\cos(\alpha + \alpha'), \sin(\alpha + \alpha')). \end{aligned}$$

Die letzte Zeile ergibt sich aus den *Additionstheoremen* für die Funktionen $\sin \alpha$ und $\cos \alpha$. Das Produkt $z \cdot z'$ hat demnach die Länge $|z| \cdot |z'|$, und es schließt mit der x -Achse den Winkel $\alpha + \alpha'$ ein.



Der Betrag komplexer Zahlen erfüllt dieselben Gesetze wie der Betrag reeller Zahlen. Die Beweise ergeben sich aus der geometrischen Interpretation von $|\cdot|$, $+$ und \cdot .

Satz 37. *a) Dreiecksungleichung:* $|x + y| \leq |x| + |y|$

b) $|x| \geq 0$

c) $|x| = 0 \leftrightarrow x = 0$

d) $-|x| \leq x \leq |x|$

e) $|-x| = |x|$

f) $|xy| = |x||y|$

g) $|x^n| = |x|^n$

h) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Komplexe Multiplikation mit $z = x + i y = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ bedeutet eine *Streckung* um den Faktor $|z|$ und eine *Drehung* um den Winkel α .

Multiplikation mit i ist eine Drehung um den Winkel $\frac{\pi}{2}$ ($\hat{=}$ 90°).


Multiplikation mit -1 ist eine Drehung um den Winkel π ($\hat{=}$ 180°).

Daher ist $i \cdot i = -1$.

Satz 38. *Der komplexe Einheitskreis*

$$S = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

bildet zusammen mit der Multiplikation, der Operation $^{-1}$ und der 1 eine kommutative Gruppe. Dies ist die Gruppe der Drehungen der Ebene.



Satz 39. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$ und jedes $z \in \mathbb{C}$ gibt es ein $a \in \mathbb{C}$ mit $a^n = z$.

Beweis. Sei $z = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha)$. Für $a = \sqrt[n]{|z|} (\cos \frac{\alpha}{n} + i \sin \frac{\alpha}{n})$ ist $a^n = z$. \square

Satz 40. Jedes quadratische Polynom

$$p(z) = c_2 z^2 + c_1 z + c_0$$

mit Koeffizienten $c_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $c_1, c_0 \in \mathbb{C}$ in der Variablen z besitzt Nullstellen $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$, so dass $p(a_1) = 0$ und $p(a_2) = 0$ und mit denen das Polynom in Linearfaktoren zerfällt:

$$p(z) = c_2 (z - a_1) (z - a_2)$$

Dabei kann $a_1 = a_2$ sein.

Beweis. Wir arbeiten mit der bekannten *quadratischen Ergänzung*:

$$\begin{aligned}c_2 a^2 + c_1 a + c_0 = 0 &\iff a^2 + \frac{c_1}{c_2} a + \frac{c_0}{c_2} = 0 \\&\iff a^2 + \frac{c_1}{c_2} a + \frac{c_1^2}{4 c_2^2} - \frac{c_1^2}{4 c_2^2} + \frac{c_0}{c_2} = 0 \\&\iff \left(a + \frac{c_1}{2 c_2}\right)^2 = \frac{c_1^2}{4 c_2^2} - \frac{c_0}{c_2} \\&\iff a_{1,2} + \frac{c_1}{2 c_2} = \pm \sqrt{\frac{c_1^2}{4 c_2^2} - \frac{c_0}{c_2}} \\&\iff a_{1,2} = -\frac{c_1}{2 c_2} \pm \sqrt{\frac{c_1^2}{4 c_2^2} - \frac{c_0}{c_2}}\end{aligned}$$

Weiter ist

$$\begin{aligned} & c_2 \left(z - \left(-\frac{c_1}{2c_2} + \sqrt{\frac{c_1^2}{4c_2^2} - \frac{c_0}{c_2}} \right) \right) \left(z - \left(-\frac{c_1}{2c_2} - \sqrt{\frac{c_1^2}{4c_2^2} - \frac{c_0}{c_2}} \right) \right) \\ &= c_2 \left(\left(z + \frac{c_1}{2c_2} \right)^2 - \left(\sqrt{\frac{c_1^2}{4c_2^2} - \frac{c_0}{c_2}} \right)^2 \right) \\ &= c_2 \left(z^2 + z \frac{c_1}{c_2} + \frac{c_1^2}{4c_2^2} - \frac{c_1^2}{4c_2^2} + \frac{c_0}{c_2} \right) = c_2 z^2 + c_1 z + c_0 = p(z). \end{aligned}$$

□

Die komplexen Zahlen sind bezüglich Nullstellen von Polynomen beliebigen Grades abgeschlossen.

Satz 41. (Fundamentalsatz der Algebra) *Sei*

$$p(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0$$

ein Polynom in der Variablen z vom Grad $n \geq 1$ mit Koeffizienten $c_n \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_0 \in \mathbb{C}$. Dann besitzt $p(z)$ Nullstellen $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$,

$$p(a_1) = p(a_2) = \dots = p(a_n) = 0,$$

mit denen $p(z)$ in Linearfaktoren zerfällt:

$$p(z) = c_n (z - a_1) (z - a_2) \cdots (z - a_n).$$

Der Fundamentalsatz ist ein schwieriger Satz der Algebra. Die Nullstellen lassen sich im Allgemeinen anders als beim Grad 2 nicht durch Wurzelausdrücke angeben.

Wir zählen nochmals die bisher betrachteten Zahlbereiche auf:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Hierauf stehen die Operationen

$$+ , \cdot , - , ^{-1} , x - y , \frac{x}{y} , |x|$$

zur Verfügung. Sie erweitern sich von einem Zahlbereich zu einem größeren, und einige sind auf kleinen Zahlbereichen nur teilweise definiert.

Die Relation $<$ steht auf \mathbb{R} und seinen Teilbereichen zur Verfügung.

Grenzwerte von Folgen

Das Integral


$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

kann berechnet werden, indem man in der Abschätzung

$$\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

zeigt, dass linke und rechte Seite „gegen $\frac{1}{3}$ gehen, wenn n gegen unendlich geht“. Daher wollen wir *Grenzwerte* von Termen wie $\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$ bestimmen, wenn „ n gegen unendlich geht“, also Grenzwerte von *Folgen* wie

$$\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{1}\right)^2, \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2, \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2, \dots, \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2, \dots$$



Definition 42. *Eine Folge ist eine unendliche Sequenz*

$$(a_n)_n = (a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots)$$

von reellen oder komplexen Zahlen, wobei $m \in \mathbb{Z}$ eine ganze Zahl ist. In der Regel ist dieser kleinste Index 0 oder 1.

Das Verhalten von Folgen „im Unendlichen“ wird mit Hilfe von Relationen wie $m \geq m_0$ oder $|x| < \varepsilon$ erfasst, wobei man sich m_0 als „große“ Zahl oder ε als „kleine“ Zahl vorstellt.

Definition 43. Sei $(a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots)$ eine Folge. Eine Zahl $b \in \mathbb{C}$ ist **Grenzwert** dieser Folge, falls es für alle reellen Zahlen $\varepsilon > 0$ einen Index n_0 gibt, so dass für alle $n \geq n_0$ gilt:

$$|b - a_n| < \varepsilon.$$

Wir schreiben dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b.$$

Eine Folge ist **konvergent**, wenn sie einen Grenzwert besitzt.

Satz 44. *Eine Folge $(a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots)$ besitzt höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Angenommen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ mit $b \neq c$. Sei $\varepsilon = \frac{|c-b|}{2}$. Weil $b \neq c$ ist $\varepsilon > 0$. Nach der Definition von „Grenzwert“ wähle natürliche Zahlen n_0 und n_1 so dass

$$\text{für alle } n \geq n_0: |b - a_n| < \varepsilon, \text{ und für alle } n \geq n_1: |c - a_n| < \varepsilon.$$

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0, n_1$. Dann ist nach der Dreiecksungleichung

$$|c - b| \leq |(c - a_n) + (a_n - b)| \leq |c - a_n| + |b - a_n| < 2\varepsilon = |c - b|.$$

Widerspruch. □

Eine Folge besitzt also entweder *keinen* Grenzwert, oder einen *eindeutig bestimmten* Grenzwert. $\lim_{n \rightarrow \infty}$ verhält sich wie eine teilweise definierte, *partielle* Funktion, die auf Folgen angewendet wird.

Beispiele

Satz 45. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Nach Satz 28 wähle ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ ist dann

$$\left| 0 - \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon. \quad \square$$

Satz 46. $\lim_{n \rightarrow \infty} n$ existiert nicht.

Beweis. Angenommen $\lim_{n \rightarrow \infty} n = b$. Für $\varepsilon = 1$ wähle ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$: $|b - n| < 1$. Nach dem Archimedischen Axiom wähle ein $n \in \mathbb{N}$, so dass $n \geq n_0$ und $n \geq b + 1$. Dann ist $|b - n| = n - b \geq 1$, obwohl wegen $n \geq n_0$: $|b - n| < 1$. Widerspruch. \square

Satz 47. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2\right) = \frac{1}{3}.$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $\frac{1}{n_0} < \frac{3}{2} \cdot \varepsilon$. Dann ist für alle $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \right| &= \frac{1}{3} \left(1 - 1 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n} \cdot \left(2 - \frac{1}{n}\right) \\ &< \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

□

Die Wahl von geeigneten n_0 und Ähnlichem in Abhängigkeit von einem „kleinen“ $\varepsilon > 0$ wird manchmal als „Epsilontik“ bezeichnet.

Die Limesoperation kann oft mit den arithmetischen Operationen vertauscht werden, so dass Limese bestimmt werden können, indem man Limese von einfacheren Teiltermen bestimmt und kombiniert.

Satz 48. Seien $(a_n)_n$ und $(b_n)_n$ konvergente Folgen mit Limites a und b . Dann

a) Die Folge $(a_n + b_n)_n$ ist konvergent und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) + \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$$

b) Die Folge $(a_n \cdot b_n)_n$ ist konvergent und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$$

c) Die konstante Folge $(c)_n$ ist konvergent und $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$.

d) Angenommen $b \neq 0$. Dann gibt es ein $m_0 \in \mathbb{N}$, so dass $n \geq m_0 \rightarrow b_n \neq 0$.
Weiterhin ist die Folge $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \geq m_0}$ konvergent und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) / \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$$

Beweis. a) Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$:

$$|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ und } |b - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Dann ist für $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned} |(a + b) - (a_n + b_n)| &= |(a - a_n) + (b - b_n)| \\ &\leq |a - a_n| + |b - b_n| \text{ (Dreiecksungleichung)} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

b) Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$:

$$|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1}, |a - a_n| < 1 \text{ und } |b - b_n| < \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1}$$

Dann ist für $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned} |a \cdot b - a_n \cdot b_n| &= |a \cdot b - a_n \cdot b + a_n \cdot b - a_n \cdot b_n| \\ &\leq |a - a_n| \cdot |b| + |b - b_n| \cdot |a_n| \\ &\leq |a - a_n| \cdot |b| + |b - b_n| \cdot (|a| + 1) \\ &< \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1} \cdot (|a| + |b| + 1) = \varepsilon \end{aligned}$$

c) ist einfach („trivial“).

d) Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \geq m_0$, so dass für alle $n \geq n_0$:

$$|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{\left|\frac{2 \cdot a}{b \cdot b}\right| + \frac{2}{|b|}}, |b - b_n| < \frac{\varepsilon}{\left|\frac{2 \cdot a}{b \cdot b}\right| + \frac{2}{|b|}} \quad \text{und} \quad |b_n| \geq \frac{|b|}{2}$$

Dann ist für $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a}{b} - \frac{a_n}{b_n} \right| &= \left| \frac{a \cdot b_n - b \cdot a_n}{b \cdot b_n} \right| \\ &= \left| \frac{a \cdot b_n - a \cdot b + b \cdot a - b \cdot a_n}{b \cdot b_n} \right| \\ &\leq |b - b_n| \cdot \left| \frac{a}{b \cdot b_n} \right| + |a - a_n| \cdot \frac{1}{|b_n|} \\ &\leq |b - b_n| \cdot \left| \frac{2 \cdot a}{b \cdot b} \right| + |a - a_n| \cdot \frac{2}{|b|} \\ &< \frac{\varepsilon}{\left|\frac{2 \cdot a}{b \cdot b}\right| + \frac{2}{|b|}} \cdot \left(\left|\frac{2 \cdot a}{b \cdot b}\right| + \frac{2}{|b|} \right) = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Beispiel

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right)^2 \right) &= \frac{1}{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \right) \cdot \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 0) \\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Cauchy-Folgen

Wir hatten angedeutet, dass die reellen Zahlen bessere Abschlusseigenschaften als die rationalen Zahlen haben. Insbesondere existiert $\sqrt{2}$ in \mathbb{R} . Wir wollen jetzt mit Hilfe konvergenter Folgen eine starke Abschlusseigenschaft formulieren, aus der die Abgeschlossenheit von \mathbb{R} bezüglich vieler Prozesse folgt.

Definition 49. *Eine Folge $(a_n)_n$ ist eine **Cauchy-Folge**, wenn es für alle $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass für alle $m, n \geq n_0$ gilt: $|a_n - a_m| < \varepsilon$.*

Satz 50. *Wenn $(a_n)_n$ eine konvergente Folge ist, so ist $(a_n)_n$ eine Cauchy-Folge.*

Beweis. Sei a Grenzwert von $(a_n)_n$. Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ so dass für alle $n \geq n_0$ gilt: $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. Dann gilt für alle $m, n \geq n_0$:

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leq |a - a_n| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

In den reellen Zahlen gilt die Umkehrung dieses Satzes:

Vollständigkeitsaxiom: Jede Cauchy-Folge reeller Zahlen konvergiert.

Mit Hilfe dieses Axioms kann man die Struktur der reellen Zahlen (bis auf Isomorphie) exakt festlegen.

Definition 51. Sei (a_n) eine Folge reeller Zahlen.

- a) (a_n) ist strikt monoton wachsend, wenn $m < n \rightarrow a_m < a_n$
- b) (a_n) ist monoton wachsend, wenn $m < n \rightarrow a_m \leq a_n$
- c) (a_n) ist nach oben beschränkt, wenn es ein $b \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für alle n gilt: $a_n < b$
- d) (a_n) ist strikt monoton fallend, wenn $m < n \rightarrow a_m > a_n$
- e) (a_n) ist monoton fallend, wenn $m < n \rightarrow a_m \geq a_n$
- f) (a_n) ist nach unten beschränkt, wenn es ein $b \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für alle n gilt: $a_n > b$

Satz 52. *Eine monoton wachsende nach oben beschränkte Folge $(a_m) = (a_0, a_1, \dots)$ reeller Zahlen ist eine Cauchy-Folge.*

Beweis. Sei (a_m) durch die Zahl b nach oben beschränkt, d.h. $a_m < b$. Wir müssen zeigen, dass es für alle $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass für alle $m, n \geq n_0$ gilt: $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

Angenommen, dies wäre falsch. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, so dass für alle $n_0 \in \mathbb{N}$ Zahlen $m, n \geq n_0$ existieren mit $|a_n - a_m| \geq \varepsilon$. Nach dem Archimedischen Axiom gibt es eine natürliche Zahl k , so dass $k \cdot \varepsilon > b - a_0$. Wähle nun $m_1 < n_1$ so dass $a_{n_1} - a_{m_1} \geq \varepsilon$. Wähle dann $m_2 < n_2$ so dass $n_1 < m_2$ und $a_{n_2} - a_{m_2} \geq \varepsilon$. Usw. bis zu $m_k < n_k$ mit $n_{k-1} < m_k$ und $a_{n_k} - a_{m_k} \geq \varepsilon$.

Aber dann ist

$$b - a_0 > (a_{n_k} - a_{m_k}) + (a_{n_{k-1}} - a_{m_{k-1}}) + \dots + (a_{n_1} - a_{m_1}) \geq k \cdot \varepsilon > b - a_0$$

Widerspruch. □

Unendliche Reihen

Definition 53. Sei $(a_n)_{m \leq n}$ eine reelle oder komplexe Folge. Dann definiere

$$\sum_{i=m}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=m}^n a_i$$

Der Ausdruck

$$\sum_{i=m}^{\infty} a_i = a_m + a_{m+1} + \dots$$

ist eine **(unendliche) Reihe**. Der Wert $\sum_{i=m}^{\infty} a_i$ dieser Reihe ist der Grenzwert der Folge der **Partialsommen**

$$\sum_{i=m}^n a_i$$

Wenn dieser Grenzwert existiert, so **konvergiert** die Reihe. Andernfalls **divergiert** die Reihe.

Satz 54. Wenn $\sum_{i=0}^n a_i$ konvergiert, so ist (a_i) eine Nullfolge, d.h. $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Da $\sum_{i=0}^n a_i$ konvergiert, ist die Folge der Partialsummen eine Cauchy-Folge. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $m, n \geq n_0$

$$\left| \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) - \left(\sum_{i=0}^m a_i \right) \right| < \varepsilon.$$

Dann ist für alle $n \geq n_0 + 1$

$$|a_n| = \left| \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) - \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \right| < \varepsilon$$

□

Satz 55. (Die geometrische Reihe)

a) Sei $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| < 1$. Dann ist

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

b) Sei $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| \geq 1$. Dann divergiert $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

Beweis. a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^m q^n \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{q^{m+1} - 1}{q - 1} = \frac{(\lim_{m \rightarrow \infty} q^{m+1}) - 1}{q - 1} = \frac{0 - 1}{q - 1}.$$

b) Für $|q| \geq 1$ ist $|q^n| = |q|^n \geq 1$. Daher ist (q^n) keine Nullfolge. □

Wir notieren Rechengesetze für den „Operator“ $\sum_{i=n}^{\infty}$:

Satz 56. Sei $m \leq n$. Dann konvergiert $\sum_{i=m}^{\infty} a_i$ gdw. („genau dann, wenn“) $\sum_{i=n}^{\infty} a_i$ konvergiert. In diesem Fall ist

$$\sum_{i=m}^{\infty} a_i = \sum_{i=m}^n a_i + \sum_{i=n+1}^{\infty} a_i .$$

Beweis.

$$\begin{aligned} \sum_{i=m}^{\infty} a_i &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=m}^k a_i = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=m}^n a_i + \sum_{i=n+1}^k a_i \right) = \sum_{i=m}^n a_i + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=n+1}^k a_i = \\ & \sum_{i=m}^n a_i + \sum_{i=n+1}^{\infty} a_i \end{aligned}$$

□

Satz 57. Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergente Reihen. Dann ist

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

und

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Beweis.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m (a_n + b_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^m a_n + \sum_{n=0}^m b_n \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m a_n +$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m b_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m \lambda a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\lambda \sum_{n=0}^m a_n \right) = \lambda \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m a_n = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n. \quad \square$$

Bemerkung. Dieser Satz kann folgendermaßen interpretiert werden:

Die Menge der Folgen

$$\{(a_n) \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert}\}$$

bildet zusammen mit den Operationen

$$(a_n) \oplus (b_n) := (a_n + b_n) \text{ und } \lambda \odot (a_n) := (\lambda a_n)$$

einen \mathbb{C} -Vektorraum.

Die Operation

$$(a_n) \longmapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

ist eine lineare Abbildung dieses Vektorraums in den Skalarkörper \mathbb{C} .

Das Quotientenkriterium

Satz 58. Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe. Sei θ eine reelle Zahl mit $0 \leq \theta < 1$ und $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für $n \geq n_0$

$$|a_{n+1}| \leq \theta |a_n|.$$

Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Die Tatsache, dass es ein n_0 gibt, so dass für $n \geq n_0$ eine Eigenschaft gilt, wird oft formuliert als: „**für fast alle** n gilt die Eigenschaft“.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$$

bedeutet dann: für alle $\varepsilon > 0$ gilt, dass *für fast alle* n : $|b - a_n| < \varepsilon$.

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass die Folge der Partialsummen eine Cauchy-Folge bildet. Sei $\varepsilon > 0$. Da (θ^l) eine Nullfolge ist, existiert ein $n_1 \geq n_0$, so dass für alle $l \geq n_1$

$$|a_{n_0}| \frac{\theta^{l+1-n_0}}{1-\theta} < \varepsilon.$$

Man zeigt leicht mit vollständiger Induktion, dass für $n \geq n_0$: $|a_n| \leq \theta^{n-n_0} |a_{n_0}|$. Dann ist für $k \geq l \geq n_1$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^k a_n - \sum_{n=0}^l a_n \right| &= \left| \sum_{n=l+1}^k a_n \right| \\ &\leq \sum_{n=l+1}^k |a_n| = |a_{l+1}| + |a_{l+2}| + \dots + |a_k| \\ &\leq \theta^{l+1-n_0} |a_{n_0}| + \theta^{l+2-n_0} |a_{n_0}| + \dots + \theta^{k-n_0} |a_{n_0}| \\ &= |a_{n_0}| \theta^{l+1-n_0} (1 + \theta + \theta^2 + \dots + \theta^{k-l-1}) \\ &= |a_{n_0}| \theta^{l+1-n_0} \frac{1 - \theta^{k-l}}{1 - \theta} < |a_{n_0}| \theta^{l+1-n_0} \frac{1}{1 - \theta} < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Satz 59. *Die Exponentialreihe*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

*konvergiert für alle $x \in \mathbb{C}$. Definiere die **Exponentialfunktion** als*

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Beweis. Sie $x \in \mathbb{C}$. Wir weisen das Quotientenkriterium mit $\theta = \frac{1}{2}$ nach. Nach dem Archimedischen Axiom existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\left| \frac{x}{n_0+1} \right| < \frac{1}{2}$. Dann ist für $n \geq n_0$

$$\left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| = \left| \frac{x}{n+1} \cdot \frac{x^n}{n!} \right| = \left| \frac{x}{n+1} \right| \cdot \left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{x^n}{n!} \right|.$$

□

Die Exponentialfunktion ist durch eine **Potenzreihe** definiert, d.h. durch eine Reihe der Form

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Funktionen wie $\sin(x)$ und $\cos(x)$ lassen sich ebenfalls als Potenzreihen darstellen.

Die Exponentialfunktion ist die wichtigste Potenzreihe innerhalb der Analysis. Sie besitzt viele nützliche Eigenschaften.


$$\text{Es gilt } \exp(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{n!} = \frac{0^0}{0!} = \frac{1}{1} = 1.$$

Der Wert $\exp(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^n}{n!}$ ist die fundamentale **Eulersche Zahl** e . Numerisch gilt z.B.

$$2,707 < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} < e < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4!} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4!} + \dots < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \cdot \frac{4}{3} < 2,723$$

Genauer gilt $e = 2,718281828\dots$

```
GNUpot] set xrange [-2:3]; set yrange [-1:30]; plot exp(x) with  
lines lw 5
```



```
GNUpot]
```

Satz 60. Für alle $x, y \in \mathbb{C}$ gilt

$$\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y).$$

Beweis. Mit dem „Restglied“ $R_k = \sum_{m,n \leq k, m+n > k} \frac{x^m y^n}{m! n!}$ und unter Benutzung der binomischen Formeln ist

$$\begin{aligned} \left(\sum_{m=0}^k \frac{x^m}{m!} \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^k \frac{y^n}{n!} \right) &= \sum_{m=0, n=0}^k \frac{x^m y^n}{m! n!} = \sum_{m+n \leq k} \frac{x^m y^n}{m! n!} + \\ &\quad \sum_{m, n \leq k, m+n > k} \frac{x^m y^n}{m! n!} \\ &= \sum_{l=0}^k \sum_{m=0}^l \frac{x^m y^{l-m}}{m! (l-m)!} + R_k \\ &= \sum_{l=0}^k \frac{1}{l!} \sum_{m=0}^l \frac{l!}{m! (l-m)!} x^m y^{l-m} + R_k \end{aligned}$$

$$= \sum_{l=0}^k \frac{1}{l!} (x+y)^l + R_k = \sum_{l=0}^k \frac{(x+y)^l}{l!} + R_k$$

Die Folge (R_k) der Restglieder ist eine Nullfolge. Wir nehmen an, dass k eine gerade Zahl ist:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{m,n \leq k, m+n > k} \frac{x^m y^n}{m! n!} \right| &\leq \sum_{m,n \leq k, m+n > k} \left| \frac{x^m y^n}{m! n!} \right| \\ &\leq \sum_{m,n \leq k, m+n > k} \left| \frac{(1+|x|)^k (1+|y|)^k}{\left(\frac{k}{2}\right)!} \right| \\ &\leq k^2 \cdot \left| \frac{(1+x)^k (1+y)^k}{\left(\frac{k}{2}\right)!} \right|. \end{aligned}$$

Mit Abschätzungen des Wachstums von $\left(\frac{k}{2}\right)!$ im Verhältnis zu der Potenz $(1+x)^k$ mit fester Grundzahl $(1+x)$ erhält man, dass die rechte Seite gegen 0 konvergiert.

Nach dem Satz über die Verträglichkeit von arithmetischen Operationen mit der Limesbildung gilt

$$\begin{aligned}\exp(x) \cdot \exp(y) &= \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^k \frac{x^m}{m!} \right) \cdot \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{y^n}{n!} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{m=0}^k \frac{x^m}{m!} \cdot \sum_{n=0}^k \frac{y^n}{n!} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{l=0}^k \frac{(x+y)^l}{l!} + R_k \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{l=0}^k \frac{(x+y)^l}{l!} + \lim_{k \rightarrow \infty} R_k \\ &= \exp(x+y) + 0 = \exp(x+y)\end{aligned}$$

□

Satz 61. Für alle ganzen Zahlen $n \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\exp(n) = e^n.$$

Deshalb schreiben wir auch e^x statt $\exp(x)$.

Beweis. Für $n \geq 0$ benutzen wir das Prinzip der vollständigen Induktion.

Induktionsverankerung: $\exp(0) = 1 = e^0$.

Induktionsschluss: Sei $\exp(n) = e^n$. Dann ist

$$\exp(n + 1) = \exp(n) \cdot \exp(1) = e^n \cdot e = e^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt die Behauptung für alle $n \in \mathbb{N}$.

Für negative $n \in \mathbb{Z}$ mit $n < 0$ gilt $\exp(n) \cdot \exp(-n) = \exp(n - n) = \exp(0) = 1$ und

$$\exp(n) = \frac{1}{\exp(-n)} = \frac{1}{e^{-n}} = e^n.$$

□

Weitere Konvergenzkriterien

In den Beweisen zur Funktion e^x wurden Techniken benutzt, die wir noch einmal allgemein betrachten wollen.

Definition 62. Eine Reihe $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut, wenn $\sum_{n=m}^{\infty} |a_n|$ konvergiert.

Satz 63.

a) Die harmonische Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ divergiert.

b) Die alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1}}{i} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

konvergiert.

c) Die alternierende harmonische Reihe ist nicht absolut konvergent.

Beweis. *a)* Die Partialsummen der harmonische Reihe werden beliebig groß, denn

$$\begin{aligned} & [1] + \left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right] + \left[\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right] + \dots > \\ & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \end{aligned}$$

c) folgt sofort aus *a)*.

b) Wir zeigen, dass die Partialsummen der alternierenden harmonischen Reihe eine Cauchy-Folge bilden. Sei $\varepsilon > 0$. Nach dem Archimedischen Axiom existiert ein n_0 , so dass $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Seien $n \geq m \geq n_0$. Dann ist

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i} - \sum_{i=1}^m \frac{(-1)^{i+1}}{i} \right| \\
 = & \left| \sum_{i=m+1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i} \right| \\
 = & \left| \sum_{i=m+1}^n \frac{(-1)^{i-m-1}}{i} \right| \\
 = & \frac{1}{m+1} - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} \right) - \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} \right) - \dots \\
 < & \frac{1}{m+1} < \varepsilon.
 \end{aligned}$$

□

Satz 64. Die Exponentialreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ konvergiert absolut für alle $x \in \mathbb{C}$.

Beweis. Die Reihe der Absolutbeträge konvergiert, denn

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x^n}{n!} \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m \left| \frac{x^n}{n!} \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m \frac{|x|^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!} = \exp(|x|).$$

□

Satz 65. *Eine Reihe $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$, die absolut konvergiert, konvergiert auch.*

Beweis. Wir zeigen, dass die Folge der Partialsummen von $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ eine Cauchy-Folge bilden. Sei $\varepsilon > 0$. Da die Partialsummen von $\sum_{n=m}^{\infty} |a_n|$ eine Cauchy-Folge bilden, existiert ein n_0 , so dass für $l \geq k \geq n_0$

$$\sum_{n=k+1}^l |a_n| < \varepsilon.$$

Dann ist aber auch nach der Dreiecksungleichung

$$\left| \sum_{n=k+1}^l a_n \right| \leq \sum_{n=k+1}^l |a_n| < \varepsilon.$$

□

Satz 66. (Majorantenkriterium) *Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ von reellen Zahlen $a_n \geq 0$ heißt **Majorante** einer Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $|b_n| \leq a_n$. Wenn die Majorante $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (absolut) konvergiert, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ ebenfalls absolut.*

Beweis. Die Folge der Partialsummen $\sum_{n=0}^k |b_n|$ ist eine monoton wachsende Folge. Da $\sum_{n=0}^k |b_n| \leq \sum_{n=0}^k a_n$, ist die Folge weiterhin durch den Grenzwert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nach oben beschränkt. Nach Satz 52 ist die Folge der Partialsummen eine Cauchy-Folge und daher konvergent. \square

Satz 67. (Produktsatz) Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ absolut konvergierende Reihen. Definiere die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ durch

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} = a_0 \cdot b_n + a_1 \cdot b_{n-1} + \dots + a_n \cdot b_0.$$

Dann ist $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut konvergent und

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$


Der Beweis kann ähnlich wie der von $\exp(x) \cdot \exp(y) = \exp(x + y)$ geführt werden.

Stetigkeit

Die meisten in der Analysis betrachteten Funktionen sind *stetig*. Eine stetige Funktion bewahrt Limes.

Definition 68. Sei $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ eine Funktion mit $M \subseteq \mathbb{C}$. Die Funktion f heißt **stetig an der Stelle** $x \in M$, wenn für jede Folge (x_n) von Elementen von M gilt:

$$\text{falls } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \text{ so ist } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$



Satz 69. (ε - δ -Kriterium) *Eine Funktion $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ wie oben ist genau dann stetig an der Stelle $x \in M$, wenn $f(x)$ der **Grenzwert** von $f(z)$ für z gegen x ist:*

$$\lim_{z \rightarrow x} f(z) = f(x).$$

Dabei ist $\lim_{z \rightarrow x} f(z) = a$ definiert durch: für alle $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ gibt, so dass

$$(*) \quad z \in M, z \neq x \text{ und } |z - x| < \delta \text{ impliziert } |f(z) - f(x)| < \varepsilon.$$

Beweis. Angenommen

$$\lim_{x' \rightarrow x} f(x') = f(x).$$

Wir zeigen die Stetigkeit von f an der Stelle x .

Sei (x_n) eine Folge von Elementen von M mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Es genügt zu zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. Sei $\varepsilon > 0$. Nach der Bedingung gibt es ein $\delta > 0$, so dass $(*)$ gilt. Wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - x| < \delta.$$

Nach $(*)$ folgt daraus weiter

$$n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - x| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - f(x)| < \varepsilon.$$

Also ist $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$.

Andererseits sei die im Satz formulierte Eigenschaft falsch. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, so dass für alle $\delta > 0$ ein $x'_\delta \in M$ existiert, für das $(*)$ nicht gilt. D.h. $|x'_\delta - x| < \delta$ aber $|f(x'_\delta) - f(x)| \geq \varepsilon$. Definiere die Folge $(x_n)_{n \geq 1}$ durch

$$x_n = x'_{\frac{1}{n}}.$$

Wegen $|x_n - x| = |x'_{\frac{1}{n}} - x| < \frac{1}{n}$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Wegen $|f(x_n) - f(x)| = |f(x'_{\frac{1}{n}}) - f(x)| \geq \varepsilon$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(x)$.

Also ist f *nicht* stetig an der Stelle x . □

In dem Satz war die (logische) **Äquivalenz** $A \Leftrightarrow B$ zweier Eigenschaften zu zeigen. Dies geschah, indem separat die **Implikationen** $B \Rightarrow A$ und $(\text{nicht } B) \Rightarrow (\text{nicht } A)$ gezeigt wurden.

Definition 70. *Eine Funktion $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ heißt stetig, wenn sie an allen Stellen $x \in M$ stetig ist.*

Wir zeigen, dass die Klasse der stetigen Funktionen viele wichtige Funktionen enthält.

Gottfried W. Leibniz, Isaac Newton usw.: „*Natura non facit saltus*“ (lat.: Die Natur macht keine Sprünge): In der Natur entwickelt sich alles stetig, stufenweise.

Satz 71.

- a) Die **konstante Funktion** $\text{const}_c: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\text{const}_c(z) = c$ ist stetig.
- b) Die **identische Funktion** $\text{id}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\text{id}(z) = z$ ist stetig.
- c) Wenn die Funktionen $f, g: M \rightarrow \mathbb{C}$ an der Stelle $x \in M$ stetig sind, so sind auch die Summe $f + g: M \rightarrow \mathbb{C}$, $(f + g)(z) = f(z) + g(z)$ und das Produkt $f \cdot g: M \rightarrow \mathbb{C}$, $(f \cdot g)(z) = f(z) \cdot g(z)$ an der Stelle x stetig.
- d) Wenn die Funktionen $f, g: M \rightarrow \mathbb{C}$ an der Stelle $x \in M$ stetig sind und $g(x) \neq 0$ so ist auch der Quotient $\frac{f}{g}: M \rightarrow \mathbb{C}$, $(\frac{f}{g})(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$ an der Stelle x stetig.
- e) Sei die Funktion $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ an der Stelle $x \in M_0 \subseteq M$ stetig. Dann ist auch die **Einschränkung** $f|_{M_0}: M_0 \rightarrow \mathbb{C}$, $(f|_{M_0})(z) = f(z)$ an der Stelle x stetig.
- f) Wenn $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und $M_0 \subseteq M$ ist, so ist $f|_{M_0}$ stetig.

Beweis. Wir benutzen die ursprüngliche Charakterisierung von Stetigkeit mit Hilfe unendlicher Folgen.

a) Sei $x \in \mathbb{C}$. Sei (x_n) eine Folge komplexer Zahlen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Dann ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{const}_c(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} c = c = \text{const}_c(x).$$

Also ist const_c stetig an der Stelle x . Da $x \in \mathbb{C}$ beliebig war, ist const_c stetig.

b) Sei $x \in \mathbb{C}$. Sei (x_n) eine Folge komplexer Zahlen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Dann ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{id}(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \text{id}(x).$$

Also ist id stetig an der Stelle x . Da $x \in \mathbb{C}$ beliebig war, ist id stetig.

c) Sei (x_n) eine Folge komplexer Zahlen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Dann gilt wegen der „Homomorphismeigenschaften“ der Limesoperation (Satz 48)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f + g)(x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) + g(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = f(x) + \\ &g(x) = (f + g)(x) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) \cdot g(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = f(x) \cdot g(x) = \\ &(f \cdot g)(x) \end{aligned}$$

Also sind $f + g$ und $f \cdot g$ an der Stelle x stetig.

d) Sei (x_n) eine Folge komplexer Zahlen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Da g an der Stelle x stetig ist, ist $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(x) \neq 0$. Daher ist *für fast alle n* : $g(x_n) \neq 0$. Durch Übergang zu einem Endstück der Folge kann man annehmen, dass für alle n : $g(x_n) \neq 0$. Dann gilt wiederum nach Satz 48

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f}{g}\right)(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)\right) / \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n)\right) = \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x).$$

Also ist $\frac{f}{g}$ an der Stelle x stetig.

e) und f) sind trivial. □

Aus dem letzten Satz folgt sofort

Satz 72.

a) *Jedes Polynom*

$$p(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0$$

mit Koeffizienten $c_n, c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_0 \in \mathbb{C}$ definiert eine stetige Funktion $p: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

b) *Je zwei Polynome $p(z)$ und $q(z)$ definieren eine **rationale Funktion** $\frac{p}{q}: \{z \in \mathbb{C} \mid q(z) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$. Diese ist stetig auf ihrem gesamten Definitionsbereich.*

Satz 73. Angenommen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$ konvergiert für ein $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Dann konvergiert die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für alle z mit $|z| < |z_0|$. Weiterhin ist die Funktion $f: \{z \mid |z| < |z_0|\} \rightarrow \mathbb{C}$ mit der Definition

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

stetig.

Daraus folgt sofort

Satz 74. Die Exponentialfunktion $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ist stetig.

Beweis. Da $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$ konvergiert, gibt es eine obere Schranke $M \in \mathbb{R}$ für die Glieder $a_n z_0^n$ der Folge:

$$|a_n z_0^n| < M.$$

Sei $R = |z_0|$. Betrachte $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < R$. Wähle r mit $|z| < r < R$. Dann gilt für y mit $|y| < r$

$$|a_n y^n| = |a_n z_0^n \frac{y^n}{z_0^n}| = |a_n z_0^n| \left| \frac{r^n}{R^n} \right| < M \left(\frac{r}{R} \right)^n.$$

Daher ist die geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} M \left(\frac{r}{R} \right)^n$ eine Majorante der Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$. Die geometrische Reihe konvergiert (absolut) für $\frac{r}{R} < 1$. Nach dem Majorantenkriterium konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ absolut, insbesondere an der Stelle z .

Zum Nachweis der Stetigkeit an der Stelle z sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass

$$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} M \left(\frac{r}{R} \right)^n = M \left(\frac{r}{R} \right)^{n_0+1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n = M \left(\frac{r}{R} \right)^{n_0+1} \frac{1}{1 - \frac{r}{R}} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Da das Polynom $\sum_{n=0}^{n_0} a_n x^n$ stetig in z ist, wähle $\delta > 0$, so dass $|z| + \delta < r$, und so dass für y mit $|y - z| < \delta$ gilt

$$\left| \sum_{n=0}^{n_0} a_n y^n - \sum_{n=0}^{n_0} a_n z^n \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Dann gilt für solche y

$$|y| = |y - z + z| \leq |y - z| + |z| < |z| + \delta < r$$

und

$$\left| \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n y^n \right| \leq \sum_{n=n_0+1}^{\infty} |a_n y^n| < \sum_{n=n_0+1}^{\infty} M \left(\frac{r}{R} \right)^n < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Also gilt für alle y mit $|y - z| < \delta$

$$\begin{aligned}
 |f(y) - f(z)| &= \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right| \\
 &= \left| \sum_{n=0}^{n_0} a_n y^n - \sum_{n=0}^{n_0} a_n z^n + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n y^n - \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n z^n \right| \\
 &\leq \left| \sum_{n=0}^{n_0} a_n y^n - \sum_{n=0}^{n_0} a_n z^n \right| + \left| \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n y^n \right| + \left| \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n z^n \right| \\
 &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.
 \end{aligned}$$

□

Aus dem Satz über die Konvergenz von Potenzreihen ergibt sich auch


Satz 75. *Angenommen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$ divergiert für ein $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Dann divergiert die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ für alle z mit $|z| > |z_0|$.*

Also ist die Menge

$$K = \{ |z| \mid z \in \mathbb{C}, \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \text{ konvergiert} \}$$

ein Anfangsstück der Menge der positiven Zahlen ist. Dabei sind folgende Fälle möglich:

- a) $K = \{0\}$: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ konvergiert nur für $z = 0$. Dann ist der **Konvergenzradius** der Reihe $= 0$.
- b) $K = [0, R) = \{x \mid 0 \leq x < R\}$. Dann ist der **Konvergenzradius** der Reihe $= R$.
- c) $K = [0, R] = \{x \mid 0 \leq x \leq R\}$. Dann ist der **Konvergenzradius** der Reihe $= R$.
- d) $K = [0, \infty) = \mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Dann ist der **Konvergenzradius** der Reihe $= \infty$.



Satz 76. (Zwischenwertsatz für stetige Funktionen) *Zu reellen Zahlen $a < b$ sei*

$$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$$

das abgeschlossene Intervall von a nach b . Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und sei y eine reelle Zahl mit $f(a) \leq y \leq f(b)$ im Fall $f(a) \leq f(b)$ oder mit $f(b) \leq y \leq f(a)$ im Fall $f(b) \leq f(a)$. Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit

$$f(x) = y.$$

Beweis. Grundidee ist es, für die gesuchte Zahl x eine „Dezimalentwicklung“ $d_0, d_1d_2\dots$ mit $d_0 \in \mathbb{Z}$ und $d_1, d_2, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}$ zu definieren, so dass anschaulich

$$x = d_0, d_1d_2\dots = d_0 + d_1 \cdot 10^{-1} + d_2 \cdot 10^{-2} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} d_i \cdot 10^{-i}.$$

Wir können **oBdA.** („ohne Beschränkung der Allgemeinheit“) annehmen, dass $f(a) \leq f(b)$. Weiter können wir annehmen, dass $f(a) < y < f(b)$ ist, denn sonst könnte man einfach $x = a$ oder $x = b$ nehmen. Außerdem setzen wir die Funktion f außerhalb von $[a, b]$ *stetig* zu $\bar{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fort:

$$\bar{f}(z) = \begin{cases} f(a), & \text{falls } z < a \\ f(z), & \text{falls } z \in [a, b] \\ f(b), & \text{falls } z > b \end{cases}$$

Nach dem Archimedischen Axiom wähle ein *maximales* $d_0 \in \mathbb{Z}$ mit der Eigenschaft

$$\bar{f}(d_0) < y \text{ (und } \bar{f}(d_0 + 1) \geq y).$$

Definiere die Folge (d_n) rekursiv. Wenn d_0, \dots, d_n definiert sind mit


$$\bar{f}\left(\sum_{i=0}^n d_i \cdot 10^{-i}\right) < y \text{ (und } \bar{f}\left(\left(\sum_{i=0}^n d_i \cdot 10^{-i}\right) + 10^{-n}\right) \geq y),$$

so sei $d_{n+1} \in \{0, 1, \dots, 9\}$ *maximal* mit den Eigenschaften

$$\bar{f}\left(\sum_{i=0}^{n+1} d_i \cdot 10^{-i}\right) < y \text{ (und } \bar{f}\left(\left(\sum_{i=0}^{n+1} d_i \cdot 10^{-i}\right) + 10^{-n-1}\right) \geq y).$$

Für $n \in \mathbb{N}$ definiere

$$x_n = \sum_{i=0}^n d_i \cdot 10^{-i}.$$



Behauptung 1. Die Folge (x_n) ist eine Cauchy-Folge.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. In „Dezimaldarstellung“ gilt für $n \geq m$:

$$\begin{aligned}x_n - x_m &= d_0, d_1 \dots d_m d_{m+1} \dots d_n - d_0, d_1 \dots d_m \\&= 0, 0 \dots 0 d_{m+1} \dots d_n \\&\leq 0, \underbrace{0 \dots 001}_m = 10^{-m}.\end{aligned}$$

Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $10^{-n_0} < \varepsilon$. Dann gilt für $m, n \geq n_0$

$$|x_n - x_m| \leq 10^{-n_0} < \varepsilon.$$

qed (Behauptung 1)

Nach dem Vollständigkeitsaxiom sei $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Da (10^{-n}) eine Nullfolge ist, ist auch $x = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + 10^{-n})$. Nach Definition der Folge (d_n) gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$x_n < b \text{ und } x_n + 10^{-n} > a.$$

Damit ist

$$a \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + 10^{-n}) = x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b.$$

Weiter gilt nach Definition der Folge (d_n) für $n \in \mathbb{N}$

$$\bar{f}(x_n) < y \text{ und } \bar{f}(x_n + 10^{-n}) \geq y.$$

Da Funktion \bar{f} stetig ist, gilt

$$y \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{f}(x_n + 10^{-n}) = \bar{f}(x) = f(x) = \bar{f}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{f}(x_n) \leq y$$

Damit ist $x \in [a, b]$ und $f(x) = y$. □

Satz 77. Sei $y \geq 0$ und $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$. Dann existiert eine (eindeutig bestimmte) reelle Zahl $x \geq 0$, so dass $x^k = y$. Diese Zahl wird als k -te Wurzel von x , $\sqrt[k]{x}$, bezeichnet.

Beweis. Wir wenden den letzten Satz an auf das abgeschlossene Intervall $[a, b]$ mit $a = 0$ und $b = y + 1$ und auf die stetige Funktion

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f(z) = z^k.$$

Es ist

$$f(a) = 0^k = 0 \leq y < y + 1 \leq (y + 1)^k = b^k = f(b).$$

Nach dem Satz gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = x^k = y$. □

Satz 78. Seien $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ und $[c, d] \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossene Intervalle mit $a < b$ und $c < d$. Sei die Funktion $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ stetig und **streng monoton wachsend**, d.h.

$$a \leq u < v \leq b \Rightarrow f(u) < f(v)$$

mit $f(a) = c$ und $f(b) = d$. Dann gilt

- a) f ist **injektiv**, d.h. für $u, v \in [a, b]$ mit $u \neq v$ ist $f(u) \neq f(v)$;
- b) f ist **surjektiv**, d.h. für alle $y \in [c, d]$ existiert $x \in [a, b]$ mit $f(x) = y$;
- c) f ist **bijektiv**, d.h. f ist injektiv und surjektiv;
- d) f besitzt eine eindeutig bestimmte **Umkehrfunktion** $f^{-1}: [c, d] \rightarrow [a, b]$, so dass für alle $x \in [a, b]$: $f^{-1}(f(x)) = x$, und sodass für alle $y \in [c, d]$: $f(f^{-1}(y)) = y$;
- e) f^{-1} ist bijektiv und streng monoton wachsend;
- f) f^{-1} ist stetig.

Beweis. *a)* ist klar, denn $f(u) < f(v)$ impliziert $f(u) \neq f(v)$.

b) folgt unmittelbar aus dem Zwischenwertsatz.

c) folgt aus *a)* und *b)*.

d) Definiere $f^{-1}: [c, d] \rightarrow [a, b]$ dadurch, dass $f^{-1}(y)$ das nach *c)* eindeutig bestimmte x mit $f(x) = y$ ist.

Sei $x \in [a, b]$. Nach der Definition von f^{-1} ist $f^{-1}(f(x))$ das eindeutige x' mit $f(x') = f(x)$. Wegen der Injektivität von f ist $x' = x$ und $f^{-1}(f(x)) = x$. Sei nun $y \in [c, d]$. Dann ist $f^{-1}(y)$ das eindeutig bestimmte x mit $f(x) = y$. Dann ist $f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$.

e) f^{-1} ist injektiv: seien $y, y' \in [c, d]$ und $f^{-1}(y) = f^{-1}(y')$. Dann ist

$$y = f(f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(y')) = y'.$$

f^{-1} ist surjektiv: sei $x \in [a, b]$. Dann ist $f^{-1}(f(x)) = x$, d.h. x liegt im **Bild** von f^{-1} .

f^{-1} wächst streng monoton: seien $y, y' \in [c, d]$ mit $y < y'$. Angenommen $f^{-1}(y) \geq f^{-1}(y')$. Wegen des strengen Wachstums von f ist dann

$$y = f(f^{-1}(y)) \geq f(f^{-1}(y')) = y',$$

Widerspruch.

f) f^{-1} ist stetig: wir beweisen hier nur Stetigkeit an Stellen $y \in [c, d]$ mit $c < y < d$. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $x = f^{-1}(y) \in [a, b]$. Wegen der strengen Monotonie von f^{-1} ist $a < x < b$. Wähle $\varepsilon' > 0$ mit $\varepsilon' < \varepsilon$ und

$$a < x - \varepsilon' < x < x + \varepsilon' < b.$$

Wegen der strengen Monotonie von f ist

$$c = f(a) < f(x - \varepsilon') < f(x) = y < f(x + \varepsilon') < f(b) = d.$$

Wähle ein $\delta > 0$, so dass

$$f(x - \varepsilon') < y - \delta < y < y + \delta < f(x + \varepsilon').$$

Wenn nun $|y' - y| < \delta$, so ist $f(x - \varepsilon') < y' < f(x + \varepsilon')$ und $f^{-1}(y) - \varepsilon < x - \varepsilon' = f^{-1}(f(x - \varepsilon')) < f^{-1}(y') < f^{-1}(f(x + \varepsilon')) = x + \varepsilon' < f^{-1}(y) + \varepsilon$.

D.h. $|f^{-1}(y') - f^{-1}(y)| < \varepsilon$. Also ist f an der Stelle y stetig. \square

Satz 79.

- a) *Die Funktion $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ist streng monoton wachsend.*
- b) *$\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty) = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ ist surjektiv.*
- c) *\exp hat eine eindeutig bestimmte Umkehrfunktion $\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, den **natürlichen Logarithmus**.*
- d) *$\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig und streng monoton wachsend.*
- e) *Es gilt $\log(1) = 0$, $\log(e) = 1$ und für alle $x, y \in \mathbb{R}^+$ ist*

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y).$$

Beweis. a) Für $x > 0$ ist $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} > 1$. Für $x < 0$ ist

$$\exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)} > 0.$$

Wegen $\exp(0) = 1$ bildet \exp die reelle Achse \mathbb{R} in die positive reelle Achse \mathbb{R}^+ ab.

Für die Monotonie betrachte reelle Zahlen $x < x'$. Weil $\exp(x' - x) > 1$, ist

$$\exp(x') = \exp((x' - x) + x) = \exp(x' - x) \cdot \exp(x) > \exp(x).$$

b) Sei $y \in \mathbb{R}^+$. Aus dem Archimedischen Axiom folgt die Existenz einer natürlichen Zahl n , so dass $e^{-n} < y < e^n$. Da die Exponentialfunktion stetig ist, liefert der Zwischenwertsatz ein $x \in [-n, n]$ mit $\exp(x) = y$.

c) und *d)*. Die Existenz einer eindeutig bestimmten, stetigen und streng monoton wachsenden Umkehrfunktion $\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ folgt aus dem vorangehenden Satz.

e) Aus $\exp(0) = 1$ und $\exp(1) = e$ folgt $\log(1) = 0$ und $\log(e) = 1$. Für $x, y \in \mathbb{R}^+$ gilt

$$\exp(\log(x \cdot y)) = x \cdot y = \exp(\log(x)) \cdot \exp(\log(y)) = \exp(\log(x) + \log(y)).$$


Da \exp eine injektive Funktion ist, ist

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$$

□

This is a TeXmacs interface for GNUMplot.

```
GNUMplot] set xrange [-2:7]; set yrange [-2:4]; plot exp(x) with  
lines lw 5; plot log(x) with lines lw 5; plot 0; plot x;  
set parametric; plot 0,t
```



```
GNUMplot]
```


Trigonometrische Funktionen

Sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Wegen der absoluten Konvergenz der Exponentialreihe ist

$$\begin{aligned} e^{i\alpha} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} e^{-i\alpha} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\alpha)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\alpha)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\alpha)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n}}{(2n)!} - i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned} |e^{i\alpha}| &= \sqrt{(\Re(e^{i\alpha}))^2 + (\Im(e^{i\alpha}))^2} = \sqrt{(\Re(e^{i\alpha}) + i\Im(e^{i\alpha}))(\Re(e^{i\alpha}) - i\Im(e^{i\alpha}))} \\ &= \sqrt{e^{i\alpha} e^{-i\alpha}} = \sqrt{e^0} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

Die Exponentialfunktion bildet die imaginäre Achse $i \mathbb{R}$ in den komplexen Einheitskreis ab:

$$\exp: i \mathbb{R} \rightarrow \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$



Daraus ergeben sich die Definitionen der **Cosinus-** und der **Sinusfunktion**:

$$\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cos(\alpha) = \Re(e^{i\alpha}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \mp \dots$$


$$\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sin(\alpha) = \Im(e^{i\alpha}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} = \alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} \mp \dots$$

Es gilt $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$. Für komplexe Zahlen $z = x + i\alpha$ ist

$$e^z = e^{x+i\alpha} = e^x e^{i\alpha} = e^x (\cos \alpha + i \sin \alpha).$$

Satz 80. Die Cosinusfunktion $\cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1, +1]$ ist stetig. Es gilt $\cos(0) = 1$ und $\cos(2) < 0$. Auf dem Intervall $[0, 2]$ ist die Cosinusfunktion streng monoton fallend. Die Funktion \cos hat in dem Intervall $[0, 2]$ eine eindeutig bestimmte Nullstelle $\frac{\pi}{2}$, mit $\pi = 3,14\dots$.

```
GNUplot] set xrange [-1:3.5]; set yrange [-1:1]; plot 0; plot cos(x) with lines lw 5
```




```
GNUplot]
```

Satz 81. Die Cosinusfunktion ist periodisch mit der Periode ($\hat{=}$ Frequenz) 2π , d.h. $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$.

Beweis. $\cos(x + 2\pi) = \Re(e^{i(x+2\pi)}) = \Re(e^{ix} e^{i2\pi}) = \Re(e^{ix} (e^{i\frac{\pi}{2}})^4)$
 $= \Re(e^{ix} (\cos\frac{\pi}{2} + i \sin\frac{\pi}{2})^4) = \Re(e^{ix} (0 + i)^4) = \Re(e^{ix} (i^4)) = \Re(e^{ix}) = \cos(x). \quad \square$


GNUplot] set xrange [-15:15]; set yrange [-1:1]; plot 0; plot cos(x) with lines lw 5



GNUplot]

Satz 82. Die Sinusfunktion $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, +1]$ ist stetig. Es gilt $\sin(0) = 0$ und $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Die Sinusfunktion hat die Periode 2π .


```
GNUplot] set xrange [-1:7]; set yrange [-1:1]; plot 0; plot sin(x) with lines lw 5
```




```
GNUplot]
```

Das Bogenmaß

Der Winkel zwischen der positiven reellen Achse und dem Vektor $e^{i\alpha}$ wird zweckmäßig mit α bezeichnet. Damit wird der Winkel im **Bogenmaß** gemessen: α ist die Länge des Kreisbogens von 1 bis $e^{i\alpha}$. Das Bogenmaß ist zum **Gradmaß** proportional: $\frac{\pi}{2} \sim 90^\circ$, d.h. $\alpha \sim \left(\frac{2\alpha}{\pi} 90^\circ\right)^\circ$.



Die Bogenlänge eines Kreisbogens mit Radius 1 und Winkel α lässt sich approximieren, indem der Bogen in n gleiche Teilbögen zerlegt wird und die Längen $2 \sin \frac{\alpha}{2n}$ der zugehörigen **Sehnen** oder **Sekanten** summiert werden.



Die Länge des Kreisbogens zum Radius 1 und Winkel $\alpha > 0$ ist dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n \sin \frac{\alpha}{2n}).$$

$$2n \sin \frac{\alpha}{2n} = 2n \left(\frac{\alpha}{2n} - \frac{\alpha^3}{3! (2n)^3} + \frac{\alpha^5}{5! (2n)^5} \mp \dots \right)$$

Für hinreichend großes $n \in \mathbb{N}$ kann das abgeschätzt werden als

$$\alpha - \frac{\alpha^3}{3! (2n)^2} = 2n \left(\frac{\alpha}{2n} - \frac{\alpha^3}{3! (2n)^3} \right) < 2n \sin \frac{\alpha}{2n} < 2n \frac{\alpha}{2n} = \alpha$$

Damit ist

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha - \frac{\alpha^3}{3! (2n)^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (2n \sin \frac{\alpha}{2n}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha = \alpha$$

Damit hat ein Winkel α die Bogenlänge (=Bogenmaß) α .

Satz 83. *Ein Kreis vom Radius $r > 0$ hat den Umfang $2 \pi r$.*

Beweis. Für den Radius r haben die Sehnen in der obigen Abschätzung die Länge $r \sin \frac{\alpha}{2n}$. Der Kreisumfang ist dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2 n r \sin \frac{2 \pi}{2 n}) = r \lim_{n \rightarrow \infty} (2 n \sin \frac{2 \pi}{2 n}) = r 2 \pi .$$

□

Satz 84. *Die Tangensfunktion*

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

ist auf der Menge $\mathbb{R} \setminus \{n \pi + \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{R} \setminus \{\alpha \mid \cos \alpha = 0\}$ definiert und stetig.

Für $n \in \mathbb{Z}$ ist der **linke Limes**

$$\lim_{\alpha \nearrow n\pi + \frac{\pi}{2}} \tan \alpha = +\infty,$$

d.h. für alle $Z \in \mathbb{R}$ existiert ein $\delta > 0$, so dass

$$\alpha \in \left(n\pi + \frac{\pi}{2} - \delta, n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow \tan \alpha > Z.$$

Für $n \in \mathbb{Z}$ ist der **rechte Limes**


$$\lim_{\alpha \searrow n\pi + \frac{\pi}{2}} \tan \alpha = -\infty,$$

d.h. für alle $Z \in \mathbb{R}$ existiert ein $\delta > 0$, so dass

$$\alpha \in \left(n\pi + \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2} + \delta\right) \longrightarrow \tan \alpha < Z.$$

Damit sind die Geraden $\{(x, y) \mid x = n\pi + \frac{\pi}{2}\}$ **Asymptoten** (griech. „nicht übereinstimmend“) der Tangensfunktion.

```
GNUplot] set xrange [-5:5]; set yrange [-10:10]; plot 0; plot tan(x) with lines lw 5; set  
parametric; set trange [-10:10]; plot -pi/2,t; plot pi/2,t
```



```
GNUplot]
```

Satz 85. *Die Cotangensfunktion*

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

ist auf der Menge $\mathbb{R} \setminus \{n \pi \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{R} \setminus \{\alpha \mid \sin \alpha = 0\}$ definiert und stetig.

Für $n \in \mathbb{Z}$ ist


$$\lim_{\alpha \rightarrow -(-n\pi)} \cot \alpha = -\infty$$

und

$$\lim_{\alpha \rightarrow +(-n\pi)} \cot \alpha = +\infty$$

Die Geraden $\{(x, y) \mid x = n \pi\}$ sind Asymptoten der Cotangensfunktion.

```
GNUplot] set xrange [-5:5]; set yrange [-10:10]; plot 0; plot 1/tan(x) with lines lw 5; set  
parametric; set trange [-10:10]; plot -pi,t; plot 0,t; plot pi,t
```



```
GNUplot]
```



Trigonometrische Umkehrfunktionen

Die trigonometrischen Funktionen sind auf Intervallen in der Nähe der 0 streng monoton (wachsend oder fallend) und stetig. Sie besitzen daher streng monotone und stetige Umkehrfunktionen.

Definition 86.

- a) Der **Arcuscosinus** $\arccos := \cos^{-1}: [-1, +1] \rightarrow [0, \pi]$ ist die Umkehrfunktion der Funktion $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, +1]$.
- b) Der **Arcussinus** $\arcsin := \sin^{-1}: [-1, +1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ist die Umkehrfunktion der Funktion $\sin: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, +1]$.
- c) Der **Arcustangens** $\arctan := \tan^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ist die Umkehrfunktion der Funktion $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$.
- d) Der **Arcuscotangens** $\operatorname{arccot} := \cot^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$ ist die Umkehrfunktion der Funktion $\cot: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$.


```
GNUplot] set xrange [-1.1:1.1]; set yrange [-4:4]; plot 0; plot asin(x) with lines lw 5;
plot acos(x) with lines lw 5
```



```
GNUplot]
```

Weil $\cot(\arctan(\frac{1}{x})) = \frac{1}{\tan(\arctan(\frac{1}{x}))} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$ ist $\operatorname{arccot}(x) = \arctan(\frac{1}{x})$.

```
GNUplot] set xrange [-10:10]; set yrange [-4:4]; plot 0; plot atan(x) with lines lw 5; plot
x>0? atan(1/x) : atan(1/x)+pi with lines lw 5
```



```
GNUplot]
```

```
GNUplot]
```

Ableitungen

Definition 87. Sei $M \subseteq \mathbb{C}$ und $f: M \rightarrow \mathbb{C}$. f ist an der Stelle $z \in M$ **differenzierbar**, falls

$$\lim_{y \rightarrow z} \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

existiert. Das heißt, dass es genau eine Zahl $f'(z) \in \mathbb{C}$ gibt, so dass es für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit

$$|y - z| < \delta, y \in M \text{ und } y \neq z \text{ impliziert } \left| \frac{f(y) - f(z)}{y - z} - f'(z) \right| < \varepsilon.$$

Dann ist $f'(z)$ die **Ableitung** von f an der Stelle z . Wenn f an jeder Stelle $z \in M$ differenzierbar ist, so heißt f **differenzierbar** und $f': M \rightarrow \mathbb{C}$ ist die **Ableitung** von f . Wenn f' stetig ist, so heißt f **stetig differenzierbar**.

Satz 88. Für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ist die Funktion z^n auf \mathbb{C} stetig differenzierbar und

$$(z^n)' = n z^{n-1}.$$

Beweis. Für $y \neq z$ ist

$$\frac{y^n - z^n}{y - z} = y^{n-1} + y^{n-2} z + \dots + y z^{n-2} + z^{n-1}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow z} \frac{y^n - z^n}{y - z} &= \lim_{y \rightarrow z} (y^{n-1} + y^{n-2} z + \dots + y z^{n-2} + z^{n-1}) \\ &= \lim_{y \rightarrow z} y^{n-1} + \lim_{y \rightarrow z} y^{n-2} z + \dots + \lim_{y \rightarrow z} y z^{n-2} + \lim_{y \rightarrow z} z^{n-1} \\ &= \underbrace{z^{n-1} + \dots + z^{n-1}}_n \\ &= n z^{n-1}. \end{aligned}$$

□

Satz 89. Wenn $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ an der Stelle $z \in M$ differenzierbar ist, so ist f an der Stelle z stetig.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Da $f'(z) = \lim_{y \rightarrow z} \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$ existiert, gibt es $\delta > 0$ mit

$$\delta < \frac{\varepsilon}{|f'(z)| + \varepsilon}$$

und

$$|y - z| < \delta, y \in M, y \neq z \longrightarrow \left| \frac{f(y) - f(z)}{y - z} - f'(z) \right| < \varepsilon.$$

Dann ist

$$\left| \frac{f(y) - f(z)}{y - z} \right| < |f'(z)| + \varepsilon$$

und

$$|f(y) - f(z)| < |y - z| \cdot (|f'(z)| + \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{|f'(z)| + \varepsilon} \cdot (|f'(z)| + \varepsilon) = \varepsilon$$

□